

2016 New

양돈장관리매뉴얼 미얀마어판

ဝက်ဖွေးမြှေးခြုံထိန်းသိမ်းရေးလက်ခွဲစာအုပ် မြန်မာဘာသာ တားရှုံး
ခုခြားများမြှင့်ဆည်းစွာ ပေါ်ပေါ်လေ့လာမှု မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကြောင်း





2016 New

양돈장관리매뉴얼 미얀마어판



2016 New

양돈장관리매뉴얼 미얀마어판

ဝက်မွေ့မြို့ရေးမှု ထိန်းသိမ်းရေးလက်ဆွဲတွေ့အုပ် မြန်မာဘာသာ ဗားရှင်း
ခါးခါးများ အကြောင်းအရာများ ပေါ်ပေါ်လေ့ရှိနေပါသည်။

발간사



안녕하십니까

아름다운 나라 미안마에서 오신 여러분을 환영합니다. 낯선 환경과 여건 속에서도 최선을 다하시는 여러분의 노고에 깊은 감사를 드리며, 특히 양돈현장에서 여러분의 열정과 땀방울이 우리나라 양돈산업의 든든한 밑받침이 되고 있습니다.

양국은 오래전부터 우호 관계를 유지해 오고 있고, 향후 여러 분야에서 더욱 더 밀접한 협력관계를 유지해 나갈 것입니다.

양돈현장에서 겪는 가장 큰 어려움 중 하나는 언어적 차이로 인한 소통 및 현장 적응의 어려움일 것으로 생각됩니다. 새롭게 빌간하는 〈2016 NEW 양돈장관리매뉴얼〉은 양돈현장의 현실을 보다 심도있게 반영하여 활용도를 한층 높였으며, 언어도 10개국(베트남, 몽골, 캄보디아, 태국, 네팔, 중국, 미얀마, 우즈베키스탄, 라오스, 영어)으로 확대 하였습니다.

양돈장에서 꼭 알아야 할 사항들을 자세히 설명하고, 사진과 그림을 통하여 시각적으로 보여주어 이 책을 읽는 모든 분들의 이해를 돋고자 노력하였습니다. 이 책자를 통해 양돈농가와 외국인 근로자에게 실질적인 도움이 되기를 바랍니다.

농협은 앞으로도 양돈농가들이 당면한 현안을 해결하기 위하여 최선의 노력을 다할 것을 약속드리며, 끝으로 〈2016 NPAW 양돈자금관리법〉의 발기를 위하여 도운을 주시 모든 분들께 감사의 말씀을 드립니다.

농협중앙회 출산경제대표이사

김태화

အမျိုးသားစိတ်ပို့မွေးမြေရေးသမဝါယမအသင်း
ခုပ်မွေးမြေရေးဌနCEO

ကင်းဝါယာန်

ကျွန်တော်တို့ နှစ်ရိုင်ငံသည် အရှိန်ကြောဖြစ်ခဲ့သူ ခရီးကြပ်ရေးဆက်လမ်း ထိန်းသိမ်းခွဲသော်လည်း ကျွန်တော်တို့ နှစ်ရိုင်၏
ဝက်ဖွေမြေပြောဂျာပုံနှင့်တွင် နှစ်ရိုင်င်၏ ဘာသာဝါကာအကျိုးမြှုပူမြှုပ်ကြောင့် အနည်းငယ် အကောက်အချုပ်များ ပြောတွေ့နေပြီး ဝက်ဖွေမြေပုံနှင့်ရှုင်ရှုပ်များသို့ ဝေါ်သော အကောက်အချုပ်တွေကြပ်ကြိုပ်လမ်ား ထဲပို့သည်။

ဝင်မွေ့ပြုရော်စွဲတွင် သိသန၏ထိတိကိုသင့် အချက်များအောင် အသေးစိတ်ရှင်းလည်ပြီး ဂါဏ်ပုံနှင့် ပုံများတော်ကြောင်သာထင်ရှားရေးနှင့်ပြုသုပ္ပါး ကြုံဥဇ္ဈာန်ဘုရားဖော်ရော်စွဲတွင် အားလည်းကောင် ကြိုးပိုး အားစိတ်ထောင်သာည်၊ ကြုံဥဇ္ဈာန်ဘုရားဖော်ရုံးပြီး ဝင်မွေ့ပြုရော်လည်ငွေ့နှင့် နိုင်ငံပြုးသား အဖွင့်သာများ လက်တွေ့ကုန်အပူရှိရှင်းသွေ့ အဲရှုံးချက်များကိုဖြော်ပြု၍ ထိုးဆောင်ရွက်ပေးသည်။

안녕하십니까. 한돈자조금관리위원장 겸 대한한돈협회 회장 이병규입니다.

축산업은 전체 농업생산액의 절반 가까이를 차지하는 대표적인 산업으로서 국민에게 우수한 단백질원을 공급하는 식량산업입니다. 특히 우리 한돈산업은 연이은 FTA 등의 어려움 속에서도 전체 농림업 생산액 중 쌀 다음으로 부동의 1위를 지키고 있는 국민의 대표적인 단백질 공급원으로 성장했습니다. 이러한 성과를 낼 수 있도록 양돈현장에서 묵묵히 힘써 주신 한돈인 여러분과 외국인 근로자 여러분의 노고에 감사를 드립니다.

우리 한돈인들은 유럽, 미국 등 세계의 양돈선진국과 자신있게 경쟁하고, 한돈산업을 농업 분야 중 가장 경쟁력 있는 산업으로 만들기 위한 목표를 갖고 최선을 다하고 있습니다. 한돈자조금관리위원회와 농협 축산경제는 이러한 목표를 달성하기 위해 한돈자조금사업의 일환으로 양돈장에서 일하는 외국인 근로자들과 원활한 언어소통을 돋고 대지를 잘 키울 수 있도록 하기 위해 양돈장관리사항에 대한 주요 내용을 정리한 외국어판 매뉴얼을 발간하게 되었습니다.

이번 책자는 우리 양돈현장에서 함께하는 외국인 근로자들의 국적 다양화와 한돈농기의 추가 보급 요청 등을 반영해 베트남, 몽골, 카보디아, 태국, 네팔, 중국, 미얀마, 우즈베키스탄, 라오스, 그리고 영어 등 10개 국어로 확대 보급하는 만큼 양돈 현장에서 큰 도움이 될 것으로 기대하고 있습니다.

이번 책자의 발간으로 외국인 근로자의 현지 적응에 도움을 주고 양돈현장의 주요 업무를 쉽게 이해하는 계기가 될 뿐만 아니라 우리 한돈농가의 생산성 향상과 소득증대에도 기여하기 기원합니다. 앞으로도 현장의 교육을 강화하고, 한돈 현장에 가장 유익하고 실질적인 정보를 제공하는 데 최선을 다할 것입니다.

끝으로, 이번 책자 발간이 원활하게 이루어질 수 있도록 노력해주시는 농협중앙회 관계자분들께 감사의 말씀을 전하며, 아울러 이번 책자를 성공적으로 마무리할 수 있도록 아낌없는 지원을 해주신 많은 업계 관계자분들께도 깊이 감사드립니다.

여러분의 일터와 가정에 건강과 행복이 가득하시길 기원드립니다.

감사합니다.

자조금관리위원장
대한한돈협회 회장
이병규

ဘဏ္ဍာဂေါ်ထိန်းသိမ်းသည့်အဖွဲ့မြတ်

အိပ်ချောင်းဂယ္

ମର୍ଦ୍ଦିଲାପି

ကိုယ်ပါယာ:ဝင်ဖွေမြှေပြေရောဘဏ္ဍာဂျေထိန်းသိမ်းသည့်အစွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ကိုယ်ပါယာ:နိုင်ငံ ဝတ်ဖွေမြှေပြေရောအစွဲ့ အဆည်း ဥက္ကဋ္ဌ ရာထူး တာဝန်ခံ ဒီဇင်ဘာ။

ထို့ゆံးလုပ်မှုများစွဲစိန်ရန်အတွက် တင်ဖွေမြှုပူနယ်စွဲတွင် အစဉ်အားထုတ်ကြုံပို့ပေးသော ကိုရိုးယေားဝင်မြေမြှုပေးအနွဲ့ဝင်မှားနှင့်စိန်ခြား
လုပ်သာများအောင် ကျော်တော်စုပါသည်။

ကြေးပမ်းသွားမည့်ဖြစ်ပသည့်။

၃။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပို့ဆောင်ရေး အာဏ်သွေးအား မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပို့ဆောင်ရေး ခါးခါးမြန်မာ

၃၂၄။ မြန်မာ့ဘုရား၏ အမြတ်ဆင့် ပို့ဆောင်ရေး



MYANMAR

언 어 미얀마어

면적 676,578km²

인구 약 55,746,253명

GDP 683억\$

기후 열대몬순기후, 온대동계건조기후

CONTENTS

양돈장 개요

○ 흐름과 관리 체계
○ 아웃풋과 품질 관리
○ 원재료와 제조 과정
○ 판매 및 배송 체계
○ 양돈장의 미래 전망

1. 주간관리의 이해

○ 아웃풋 관리
○ 원재료 관리
○ 제조 과정 관리
○ 판매 및 배송 관리

2. 한국 양돈장의 일반적인 사양 프로그램

○ 원재료 관리
○ 제조 과정 관리
○ 판매 및 배송 관리
○ 양돈장의 미래 전망

양돈관리

○ 흐름과 관리 체계
○ 아웃풋과 품질 관리
○ 원재료와 제조 과정
○ 판매 및 배송 체계
○ 양돈장의 미래 전망

1. 포유자돈 관리

○ 흐름과 관리 체계
○ 아웃풋과 품질 관리
○ 원재료와 제조 과정
○ 판매 및 배송 체계
○ 양돈장의 미래 전망

2. 이유자돈 관리

○ 흐름과 관리 체계
○ 아웃풋과 품질 관리
○ 원재료와 제조 과정
○ 판매 및 배송 체계
○ 양돈장의 미래 전망

3. 육성 · 비육돈 관리

○ 흐름과 관리 체계
○ 아웃풋과 품질 관리
○ 원재료와 제조 과정
○ 판매 및 배송 체계
○ 양돈장의 미래 전망

4. 출하관리 및 도축

○ 흐름과 관리 체계
○ 아웃풋과 품질 관리
○ 원재료와 제조 과정
○ 판매 및 배송 체계
○ 양돈장의 미래 전망

5. 응돈 관리

○ 흐름과 관리 체계
○ 아웃풋과 품질 관리
○ 원재료와 제조 과정
○ 판매 및 배송 체계
○ 양돈장의 미래 전망

6. 임신돈 관리

○ 흐름과 관리 체계
○ 아웃풋과 품질 관리
○ 원재료와 제조 과정
○ 판매 및 배송 체계
○ 양돈장의 미래 전망

7. 포유모돈 관리

○ 흐름과 관리 체계
○ 아웃풋과 품질 관리
○ 원재료와 제조 과정
○ 판매 및 배송 체계
○ 양돈장의 미래 전망

8. 이유모돈(종부대기돈) 관리

○ 흐름과 관리 체계
○ 아웃풋과 품질 관리
○ 원재료와 제조 과정
○ 판매 및 배송 체계
○ 양돈장의 미래 전망

기타 관리사항

○ 흐름과 관리 체계
○ 아웃풋과 품질 관리
○ 원재료와 제조 과정
○ 판매 및 배송 체계
○ 양돈장의 미래 전망

주사시 유의사항

○ 흐름과 관리 체계
○ 아웃풋과 품질 관리
○ 원재료와 제조 과정
○ 판매 및 배송 체계
○ 양돈장의 미래 전망

미안마어 단위 표기법

○ 흐름과 관리 체계
○ 아웃풋과 품질 관리
○ 원재료와 제조 과정
○ 판매 및 배송 체계
○ 양돈장의 미래 전망

부록

○ 흐름과 관리 체계
○ 아웃풋과 품질 관리
○ 원재료와 제조 과정
○ 판매 및 배송 체계
○ 양돈장의 미래 전망

표준근로계약서

○ 흐름과 관리 체계
○ 아웃풋과 품질 관리
○ 원재료와 제조 과정
○ 판매 및 배송 체계
○ 양돈장의 미래 전망

외국인근로자방역관리지침

○ 흐름과 관리 체계
○ 아웃풋과 품질 관리
○ 원재료와 제조 과정
○ 판매 및 배송 체계
○ 양돈장의 미래 전망

양돈장 개요

010-770-0000
외래무예찬 아짜웅 아진족

1. 주간관리의 이해

○॥ အပတ်စဉ်ထိန်းသိမ်းချင်းအကြောင်း
 ပါ အပဲဆုံးဖြစ်လေ့ရှိနေမှုများ

2. 한국 양돈장의 일반적인 사양 프로그램

၂॥ ကိုစီးယား ဝက်ဖွေးပြေးမြှုပူနည်း ပတ်သက်သော အသေးစိတ် အချက်အလက်
 နှင့် ကြိုးကြော် အသေးစိတ် အချက်အလက်

02

한국 양돈장의 일반적인 사양 프로그램


|။ တိရိယားဝင်မွေးမြေးမြန် ပတ်သက်သော အသေးစိတ် အချက်အလက်
နဲ့ ကြော မြန်မာ အမြတ်ဆုတ် အမြတ်ဆုတ် အမြတ်ဆုတ် အမြတ်ဆုတ်

단어모음	ଓঁକାଳ୍ପୁଣ୍ୟ ଦ୍ରାବ୍ଦୀର୍ଯ୍ୟ ଶାକରୁଂଗ ସୁଶିଳି
이유시점 iyusijeon	ହିନ୍ଦୁବାନ୍ଦ ଅଧିକ ନୋଚିପାଇଚନ
포유자돈 poyujadon	ହିନ୍ଦୁ ହୃଦୟବିନ୍ଦୁରେ ନୋଚିପିଓପାବୁ
이유자돈 iyujadon	ହିନ୍ଦୁବାନ୍ଦିବିନ୍ଦୁରେ ନୋଚିପିଓପାବୁ

비육돈 사료급여 프로그램

အသားတိုးဝက် ဝက်စာကျွေးဇူး 애파또윌 월사쬐친






단어모음 စကားလုံးများ စွဲည်းမှု 사까롱먀 숙시묵

모든 사료급여 프로그램

ဝက်မများအား အတေကျိုးခြင်း လုပ်ငန်း
ဩမရာမာအ အသာဆုံး



용어정리

- ① 무제한 급여
○॥ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣାତେର୍ଥମୃଣଳା
ଦିକ୍ ଆକାଶମାରିଶା
 - ② 선발
J॥ ଶ୍ରୀଶ୍ଵରପ୍ରିସ୍
ନି ବୈଚାରିକ
 - ③ 선발 21일후
ର॥ ଶ୍ରୀଶ୍ଵରପ୍ରିସ୍
ଫଂ ରାଗିଙ୍ଗାର
ଫଂ ବୈଚାରି ନିଜାନ୍ତାରୁ
 - ④ 교배 2주전
d॥ ହିଂତିଖାନ୍ତିର୍ଗଲିନ୍
ପରିଷାଧି
ରେ ମ୍ଯାକିଲିକିନ ନ୍ତାବାରୋ
 - ⑤ 교배일
e॥ ହିଂତିଖାନ୍ତିରନ୍
ଏବା ମ୍ଯାକିଲିକି
 - ⑥ 교배 30일
f॥ ହିଂତିଖାନ୍ତିପ୍ରିସ୍
୨୦ ରନ୍
ଚାଉ ମ୍ଯାକିଲିକି ଫୋଟୋଯା

- ⑦ 유선발율(선택)**
ㄱ) 키-한정된영어단어: 티미온: (ဈေးသယ်ပြိုး)
쿤 녹란짜옹풋표친 (외채친)
 - ⑧ 교배 80일**
၁။ မိတ်လိုက်ခြင်း ဆရာတ်
싯 맥락친 싯새약
 - ⑨ 분만 5일전**
၂။ မမွေ့ခဲ့ ဤရှုရှုအလို
꼬 마ဘက် 응아ယာ로
 - ⑩ 0.5kg 씩 감량**
၀၀။ 0.5 텁တိဂါရမီစီ လေ့ကျော်
뜨새 또나딱뜨마
키로그램씨 여짜
 - ⑪ 분만일**
၀၁။ မွေ့ဖူးရက်
쌔띠 မှုပါယ

- 12 분만 5일후**
ଓঁ দেৱাঙ্গাপ্রিণী গৱাঁ
মোহু-ঝাই-আয়

13 무제한 급여
ওমা অকান্তি অবসর মুক্তি লভ
ছেটু আকান্তি মাসি লাসা

14 이유
ওপু কৃষ্ণেন্দ্ৰিণী
ছেলেই নুচেচি

15 후보돈
ওমা ধূঁয়িতৰণ
ছে আ দোয়িমা

16 임신돈
ওপু গৰ্ভায়ণকী দেবোৱাঠৰণ
ছে কাশু গুৱণি দীপ দীপ

17 포유돈
ওমা কৃষ্ণ দীপ দেবোৱাঠৰণ
ছে কু নোপু দীপ

단어모음 စကားလုံများ စုစည်းမှု 사까롱먀 숙시묵

모든	မိခင်ဝက်မ
modon	မိခင်ခါမ
사료	ဝေါဘာ
salyo	ဝေါရာ
프로그램	လုပ်ငန်းစဉ်
peulogeulaem	ရွှေအဗျာ



양돈관리

ဝက်မွေးမြှေရေးခုထိန်းသိမ်းရေး 의뢰유예찬 텡뎅얘

1. 포유자돈 관리

၁။ နိုတ်သည့်ဝက်ပေါက်များ ထိန်းသိမ်းခြင်း
ပဲ နှင့်ပဲချော်မာ တွေ့ဖြတ်

2. 이용자 돈 관리

၂။ နိုင်ငံသည်ဝက်ပေါက်များ ထိန်းသိမ်ခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံတွင်လေယာဉ်များအတွက်ဖြစ်ပါသည်။

3. 육성·비육돈 관리

၃။ အရှယ်ရောက်ဝင်။
အသားတိုးဝင်များ ထိန်းသိမ်းခြင်း
뚱 아야와야육왁 아따또왁먀 텅떼친

4. 출하관리 및 도축

၄။ ရုတ်ခြင်း နှင့် သားသတ်ခြင်း
레 야웅통친닉 따딱치

5. 웅돈 관리

၅။ ၎က်ထီး ထိန်းသိမ်းခြင်း
 을아 왈티 텅뗄친

6. 임신도 관리

၆။ ကိုယ်ဝန်ရှိသော ၁၀၂ တိန်းသိမ်းခြင်း
 ခုခွဲ ကြော်လျှပ်စီး

7. 포유모동 관리

၇။ နိုဝင်ဘာလ ၁၀၂၀ တိန်းသိမ်းခြေး
ကျ လွှာတော်လှောက် တော်

8 이윤 모돈(종부 대기도) 과리

ବା ଫୁଲ୍‌ଶେଷିରୁଣ୍ଡିଙ୍କର୍ ମର୍ଗୀଃ
(ବାହାରରୁ ଦେଖିବାରୁ ନାହିଁ) ଯଦିଫୁଲ୍‌ଶେଷିରୁଣ୍ଡିଙ୍କର୍
ଏକ ପ୍ରକାରର ମର୍ଗୀଃ
(ଅତିଧିକ ପରିମାଣରେ ପାଇଁ)
ଏକ ପ୍ରକାରର ମର୍ଗୀଃ

단어모음 | စကားလုံးများ စွဲည်ဗျာ
사까롱먀 숙시목

분만사 주간관리 작업 스케줄

구 분 체계화된 교과 과정	오 전 여기온다: 마네빠인	오 후 여기온다: 네이래빠인
월요일 타파리 파닝라	철분주사, 거세 여기온다:여기온다: 따닥쎄이토친 외면친	철분주사, 거세 여기온다:여기온다: 따닥쎄이토친 외면친
화요일 아리 잉가	자돈사 지원 여기온다:여기온다: 외따빠욱찬뜻빡싸운	카드정리(분만예정돈), 치료 여기온다:여기온다: 파빠욱밋의탱땡친, 꾹따친
수요일 부정부정 복따후	분만처치, 이유준비 여기온다:여기온다: 미파친, 녹코안뺀신친	분만처치, 양자관리, 이유자돈체크 여기온다:여기온다: 미파친, 의사외탱땡친, 녹속띠외따빠욱싯쎄친
목요일 복과복하고 짜짜쁘떼	이유, 수세 여기온다:여기온다: 녹코친, 째이찌친	수세, 치료 여기온다:여기온다: 째이찌친, 꾹따친
금요일 여기온다 따육짜	유도분만, 백신, 철분주사, 양자관리 여기온다:여기온다: 여기온다:여기온다: 미파아웅록씨빠친, 딴다야嫉妒친, 의사외탱땡친	생선회 도포, 분만처치, 양자관리 여기온다:여기온다: 여기온다:여기온다: 통퓨친, 띠빠욱친, 의사외탱땡친
토요일 이동 싸네이	분만예정돈 입식, <u>이각/거세</u> 작업, 양자관리 여기온다:여기온다: 여기온다:여기온다: 여기온다:여기온다: 따빠욱밋의powied친, 나룬아랫아따뿌록친, 외민친, 회 사의마탱땡친	통합관리(주변정리정돈, 분뇨처리작업) 여기온다:여기온다:(여기온다:여기온다: 여기온다:여기온다: 수빠옹탱땡친(배빠원찐딱신친, 전지징애신린친)
일요일 타파리 파닌그뇌	기본 사양관리 여기온다:여기온다: 아체이칸아레이이썩탱친	기본사양관리 여기온다:여기온다: 아체이칸아레이이썩탱친

단어모음 օကա:လုံများ စစည်မှု 사까론မာ 술시문

일상 관리

နေ့စဉ်ထိန်းသိမ်းခြင်း
နေ့စဉ်ထိန်းသိမ်းခြင်း

온도 및 환기관리

အပူခိုင်နှင့် လေဝင်လေထွက် ထိန်းသိမ်ခြင်း အပူခိုင်နှင့် လေဝင်လေထွက် ထိန်းသိမ်ခြင်း

▶ 오전 7시 업무시작과 동시에 돈사별 온도 환기량 점검. 특히 보온등 주변의 자동상태 점검과 시설점검(전기, 누수 등) 후 사료급여. 12시까지 담당관리 업무

မနက် ဂ နာရိတ္ထ လုပ်ငန်းစဉ်လျှင်တဲ့ပြိုင်နက် ဝက်ခြားလိုက် အပူရိန် လေဝင်လေတွက်နှုန်းကိစစ်ဆေးခြင်း၊ အတုံးသဖြင့် အပူပေးခြင်း၊ အစုရိဘာ ဝက်ခြား ဘေးပတ်ဝန်းကျင်၏အခြေအနေ စစ်ဆေးခြင်းနှင့် အပြေားပစ္စည်းများစဉ်ဆေးလျှင်စစ်ဆေးခြင်း၊ ရေယိုမှု အစရှိသဖြင့် ပြီးနောက် အဟာကျွေးမြေ ၁ ပြားခိုအတိတာဝန်ခံအောင်ငွေး

마넥 쿠느나이된 통양사띠니따빼나 외찬아락 아뿌챈, 레원레툇농꼬 싯쎄친, 아투뜨
핀 아뿌빼친 아사신띠 외찬 베박원찐이아체아네 싯쎄친닉 아카뺏신마 싯세친(략싯,
에요무 아사신뜨핀)빼나눅 아사찌친, 쎔너나이아티 따원칸잇 통양

▶ 오후 1시 업무시작과 동시에 소독 후 오후 3시까지 포유자돈 관리 업무

နေ့လည် သနာရီ လုပ်ငန်းစာသည်နှင့် တဗြြမြိုင်ကို ပိုးသတ်ပြီးနောက် နေ့လည် ၃နာရီအထိ နိုဝင်ဘာ သည်တို့သားပေါက်များ တိုင်းသိမ်းခွင့်း

네잇레이 뜨나이 통양사띠닝 뜨뺀나 뾰딱뺀나우 네익레 똥나이아티 녹속띠 익따빠우
미 템페치

▶ 오후 4시 업무시작과 동시에 사료급여 후 포유자도 괴리

ଫେବ୍ରୁଆରୀ ଲେଖନ ପାଠ୍ୟମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ଏକାକିମ୍ବା ଦ୍ୱାରା ଉପରେ ଲେଖନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି।

단어모음 ဝကားလုံများ စွဲည်ဗျာ 사까롯먀 숙시묵

▶ 양수가 터진 후 1~2시간 후 분만

ရေမြှာပေါက်ပြီးနောက် ၁-၂နာရီတွင် သားပေါက်ခြင်း

애와빠욱삐나욱 띄닉나이뛰 따빠욱친

▶ 분만사 온도 : 20°C 이상 유지

သားပေါက်ခံအဗုဒ္ဓန၊ 20 ဒီဂရီစင်တိဂရီတ် အထက် ထိန်းခြင်း

따빠울찬아뿌챈 닉쎄디그리신디그랙 아텍 텩친

▶ 부만틀 옆 또는 뒤에 보온등 설치

သားပေါက်ချုံသားသို့ မဟုတ် အနောက်တွင် အပူပေးသည့်မီး တပ်ဆင်ရန်

따빠욱찬배 또마흘 아나울뛰 아뽀뻬떴미 땃신야

▶ 보온등의 높낮이 조절로 온도조절

အပူပေးသည့်မြိုက် အနိမ့်အမျင်ကို ထိန်းခိုင်းဖြင့် အပူချိန် ထိန်းသိမ်းနှင့်

아뿌뻬이떴미이 아네익아민꼬 텹친뻬 아뿌챤 텹뗄나잉

→ 충분한 깔짚 및 신문지 바닥에 깔기

ကောက်ရိုး သို့မဟုတ် သတင်းစာများကို ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင်လုပောင်စွာ ငွေးခြင်း

까워요 또마흔 따띤사야꼬 짠뺀빼뛴롱라욱솨 킨친

〈보온등 준비〉

보온상자 보온병

〈보온상자 및 보온등 설치〉
ଆପୁବେଃବାନ୍ଧୁଯେତ୍ରୀ କୁଣ୍ଡ ଆପୁବେଃବାନ୍ଧୁମିଃ ତର୍ପଳାଙ୍ଗିର୍ଦ୍ଦଃ
ଆବ୍ରବ୍ରୋଇଲ୍ଲିଟାନି ଆବ୍ରବ୍ରୋଇଲ୍ଲିମି ଲାଷିଚି

단어모음 စက္ခားလုံးများ စွဲည်းမှု 사까롱먀 숙시묵

분만	分娩
bunman	파빠육친
시작	开始
sijag	사띤친
양수	예파
yangsu	예파
온도	体温
ondo	아뿌첸
20°C	20摄氏度
isibdossi	낙제 디그리신디그레
유지	保持
yugi	탱땡친
보온등	保温带
boondeung	아뿌ழ말미
설치	安装
seolchi	타玷申친
온도조절	温度调节
ondojojeol	아뿌챈탱친
깔짚	草帽
kkaljip	까웃요
신문지	报纸
sinmunji	파띤사
깔기	铺
kkalgi	키친

2. 분만 관리

၂။ သားပေါက်သည့်အချိန်တွင် ထိန်းသိမ်းခြင်း
နဲ့ တော်ချောင်းတွင် အမြတ်ဆုံး ဖြစ်ပါသည်။

분만시 관리

သားပေါက်ရာတွင် ထိန်းသိမ်းခြင်း တဲ့ပဲအောင် တော်လှေ

▶ 새끼가 나오면 준비된 털지면이나 형겼으로 입과 코 주위를 닦아준 후 몸의 양수를 닦아 일정시간 보온등 밑에 넣어 둠.(5~30분마다 1마리씩 낳고, 한배새끼 전부를 분만하는 데는 2~3시간이 소요)

အကောင်ပေါက်လာလှုပ် ပြင်ဆင်ထားသော ဝါရွိများသို့ မူဘတ် အဝတ်စံပြင် ပါးလုပ်နှင့် နာခေါင်းတိဂုံးကို သုတေသနပေးပြီးနောက် ကိုယ်တွေရှိသော ရော်ရည်ကို သုတေသနပေးပြီး သတ်မှတ်ထားသောအချင့်တွင် အပူပေးသည့်ပြီးအောက်တွင် ထည့်ထားခြင်း(၅) - ၁ အမိန်တွေကိုင်း တစ်ကောင်စီထည့်ပြုပြီး၊ အားလုံးမှုပြီးသုတေသနအချင့်ထိ တစ်ခါးမြေပေါင်းမျှလျှင်၊ ၂ ဘန်ဒီဂါဒ် (နှုန်း)

아까웅빠우라린 뻔신타떠 와군또마혹 아윗사핀 빠갓닉 나카웅뜨았꼬 똑빼나욱 꼬
된신떠 애꽈 얘꼬 또욱빼이삐 딱맞타떠야챈된 아뿌빼띤미아욱된 텍타친(응아새미늬
짜다웅 뜻까웅시햇뻬 아롱 모빼떴아챈티 뜨ڱ뫼린 닉뚱나이칸짜디)



〈분만 관리 과정〉

3. 초유 급여 (면역획득 매우 중요함)

၃။ နိုင်းရည်တိက်ခြင်း
(ကိုယ်ခံအဘာရှိစေသည့်အတွက် အလွန်အရေးကြီး)
뚱 နဲ့ ဝွေးအများ (ကြော်ချောင်း)

▶ 손으로 문질러 유즙을 조금씩 짜 줌

ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ଦେଖିଲେ ତାହାରେ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା
ଲେଖି ଲେଖି ଲେଖି ଲେଖି ଲେଖି ଲେଖି ଲେଖି ଲେଖି

■ 먼저 난 새끼는 양수제거 등 적절한 분만자돈 조치 후 충분히 포유시켜 보온
상자에서 체열이 회복될 수 있도록 조치

아인쏭빠옥라떳아까웅아 애파떳신뻬이친 아사신떳 잇따빠옥뿌수떳아신 뻔나우 녹았
아웅따이께 꼬카아신세야 아뽀뻬탸떳 띠파티된테익뻬이친

■ 체중이 작은 자돈을 앞쪽 유두에서 포유할 수 있게 조치

단어모음	ଓଡ଼ିଆରୁ ଦୋଣ୍ଡିଲୁ
부만	ବ୍ୟାଙ୍ଗପିଲିଙ୍କିନ୍ତି
bunman	ଫାଲୁଇଚି
관리	ଦିନ୍ଦୁଳୀଙ୍କିନ୍ତି
gwanli	ଟେଲ୍ଲେଚି
틸지면	ଦିନ୍ଦିନ୍ଦି
talijimyeon	ଓରୁ
헝겊	ଅବ୍ସିଂହ
heong-geop	ଆଉଶା
입	ଧାରି
ib	ବ୍ୟାଜ
코	କୁଳେନ୍ଦି
ko	ନାକାଉ
양수	ଏମ୍ପିଟୁ
yangsu	ଏପା
보온등	ଅଭୋବାଲୁଲୁହିନ୍ତି
boondeung	ଅବ୍ରାମିଲ୍ଲିମି
초유	ଛୁଣ୍ଣିଲ୍ଲି
choyu	ନ୍ଦୁଅୟ
급여	ଗେଲ୍ଲିନ୍ତି
geub-yeo	ବ୍ୟାଚି
유즙	କୁଣ୍ଡିଲ୍ଲି
yujeub	ନ୍ଦୁଏ
짜줌	କଷିପାଲ୍ଲିନ୍ତି
jjajum	ନିଲ୍ଲେଇଚି
포유	ଫାଲ୍ଲିନ୍ତି
poyu	ନ୍ଦୁଚିନ୍ତି
작은	ଦେଖିଲୁହା
jag-eun	ପେଣ୍ଟାଫ୍ରାନ୍ତି
자돈	ଦିନ୍ଦିଲୁହିନ୍ତି
jadon	ଓଟାପ୍ରୋଟି
앞	ଅବ୍ରାମ
ap	ଅଶ୍ରୁ
유두	କୁଣ୍ଡିଲ୍ଲିଲ୍ଲିନ୍ତି
yudu	ନ୍ଦୁପାକାଉ

▶ 분할 포유 : 분만 후 며칠동안이라도 포유시 우량 자돈을 잠시 보온상자에 가두어 허약자돈이 앞쪽 유두를 차지할 수 있도록 조치

କୁ ଶ୍ରୀତିଗିରିପ୍ରିସ୍ ଇମ୍ବାର୍ ଫଳିତରେ ଏହାଙ୍କ ଫଳିତରୁଥିବୁ ବ୍ୟାଧିରାଜାତୀୟଙ୍କ ଦିନ କୁ ଶ୍ରୀତିଗିରିପ୍ରିସ୍ ଇମ୍ବାର୍ ଏହାଙ୍କ ଫଳିତରୁଥିବୁ ବ୍ୟାଧିରାଜାତୀୟଙ୍କ ଦିନ

녹쾌따이친 따빠옥뻬나육 느爇똥앳야떠아된 녹속신 빠옹뺏며 왓따빠옥먀꼬 아
뿌为抓따된 크나따텟타뺀 빠옹마뺏며 왓따빠웃먀아 아샛펫이 녹띠가응된 속세
야 뾰록빼침



〈분할 포유〉
ֆ. Շենքը ընդունած
녹쾌닥친

▶ 자돈은 분만 후 3일 이내에 자신이 포유하는 유두가 결정됨

ဝက်သားပေါက်များ ပေါက်မြို့ ရာရိအတွင်း စုံသည့် နဲ့သီးခေါင်း သတ်မှတ်ပေးမြင်း
왓따ပါ့မာ ပဲခဲ့ဖူး နဲ့သီးခေါင်း သတ်မှတ်ပေးမြင်း

▶ 통상적으로 모든 앞쪽의 유두가 비유량이 많고 한 번 정해진 유두는 이유시까지 고정됨

뿐만아핀 아색빠인된짓며 녹띠가옹이 녹툇농마 막뼈 뜨카 땃맛뺀린 녹띠가옹마 녹코
떴아챈아티 뿐떼핀친

포유기간 중 포유간격 နိုဝင်ဘာလအတွင်းကြေား ကွာဟန်			
주 차 အပတ်စဉ် အပါန	1주차 ထောမအပတ် ရှေ့တာမအပါန	2주차 ဂုဏ်ယအပတ် တူပါယအပါန	3주차 တတိယအပတ် တပါယအပါန
포유~포유간격 နိုဝင်ဘာလအတွင်း- နှီးတိုက်ခန်းကြေားကွာဟန် 녹딱친~녹딱颤자과하颤	55분 ၅၅၇နံ 응아帐篷아 미녀	71분 ၇၁၆နံ 쿠느셋뜨미녀	73분 ၇၃၈နံ 쿠느셋퐁미녀
1일중 포유횟수 တစ်ရက်အတွင်း နိုဝင်ဘာလအတွင်း 뜨옛아蓐은 녹딱잇밋 아재인	26회 ၂၆၉နံ 느颤자육째인	20회 ၂၀၅၄နံ 느셰이째인	20회 ၂၀၅၄နံ 느셰이째인

★ 주의 : 자돈은 생후 12시간까지는 초유를 분해하지 않고 흡수하여 항체를 높이기 때문에 모든 문제에 있어 초유가 나오지 않으면 12시간 안에 다른 모든의 초유급여

သတ္တုပြန်၏။ ၂၀၁၃ခုနှစ်သာမူများသည်မွေးဖွံ့ဖြိုးပြီး ၁၂၅၇ရှိအတိ နှင့်ရှိလိုက် မချောက်ဘဲစုစုပြီး ပုဂ္ဂိုလ်၏တိမြင့်တင်ပေးသည့်အတွက် မိခင်ဝင်မတွင် နှင့်ရှိယဉ်မထွက်လျှင် ၁၂၅၇ရှိအတွင်း အခြား ဝက်မ၏ နှင့်ရှိယဉ်တိက်ရန် ပတ္တုပြန်၏ ဒါန်များအတွက် မြတ်ဆုံးပေးပို့ဆောင်ရွက်နိုင်၏။

단어모음 စကားလုပ်များ စွဲညွှန်မှု
사까롱먀 숙시묵

분할	ബുൺഹാൾ
포유	പോയു
유두	യൂടു
결정	ജേൾജോം
앞쪽	അപ്പിജോഗ
비유랑	ബിയുലംഗ്
많고	മാനഹ്ഗോ
다른 모든	ദാലൈൻ മോറണ
초유급여	ചോവുഗൈു-ഡോ

4. 텯줄 제거

나 ခက်တိုးဖြတ်ခြင်း
레이 첫조펫친

■ 텯줄을 2~3cm정도 남기고 소독된 실로 묶은 후 자른 다음 옥도정기로 소독
ခက်တိုးတို့ ပုံ စင်တိုးတော်ချွဲ၊ ခန့်ထားခြား ပိုးသတ်ထားသော အင်ရှည်ခြင်း ခည်းမြတ်ပြီးနောက်
အင်ဒိုဒင်းတင်ချာဆေးရည်ဖြင့် ပိုးသတ်ခြင်း

쳇조고 닉뚱신디미터칸 찬타삐 뾰平坦띠 앗치핀 치ဘဧဧ나욱 아이오딘딘차쎄이애
핀 뾰平坦친

▶ 특히 돈방 바닥이 망일 경우에는 텯줄이 끊어져 피가 나거나 배꼽 틸장이 발
생할 가능성이 높음

အထူးသပို့ ဝါက်မြို့မောက်ရော်ပြော်ပြော်သည် ကောဖို့နေလျှင် ခက်တိုးပြုတိုး သွေးထွက်ခြင်း
ဆို့မဟုတ် အုတွေ့နာဖို့နိုင်ရောများခြင်း
아투뜨坑 왓찬잇 아웃체짠愍띠 스까핏네이린 찻조팻俾 뢵ဿ친 또마혹 우준나핀나이
체마친



〈텐줄제거 모습〉

ခက်တိုးမြတ်သည်ပုံး
쳇조펫밋樊山

5. 견치(송곳니) 제거 및 비강분무

၅။ သွားစယ်ထုတ်ခြင်းနှင့် နာဂောင်းဆေးဖုန်းခြင်း
옹아 파페tot친 니 나카웅ဧ판친

목적 및 부작용

ရည်ရွယ်ခက်နှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး
이외찬닉 배媞소쪼

▶ 포유시 모든의 유방과 유두 상처 및 자돈간의 싸움으로 인한 상처 방지

နို့တို့တို့ ဝါက်မားရင်သားနှင့် နို့သီးခေါ်းခေါ်းများ ရန်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်
အနာဖြစ်ဖြစ်ခြင်းမှ ကာဘယ်ရန်

녹파잇신 왓마잇 인파닉 녹띠까옹아나 왓따빠욱끄레이마 얀핀친짜웃 아나핀친마 까
괴얀

▶ 돼지는 상하 좌우에 2개씩 총 8개의 송곳니가 있고 이를 모두 잘라 줌

ဝါက်များသည် အထက်အောက် ဘယ်ညာတွင် ၂ခေါ်းခါ်းမြို့မြို့ စုံပေါ်းပေါ်းမြို့မြို့များ
အေးလုံးတို့ ဖြတ်ပေးခြင်း

윗마띠 아텟아욱 배나蓐် 느차잉시핀 수수빠옹 땅신자옹빠웃俾 토파먀 아롱꼬 팻뻬이
친

▶ 최근 부작용 때문에 견치를 하지 않는 곳도 있음

ယခုအခါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကြောင့် အံသွားမဖြတ်သည့်နေရာလည်းရှိခြင်း
야쿠아카 베이ဧဧ소쪼짜웃 안파마팻밋네이야레 싯친

단어모음 ဝါဘာလုံးများ စုံပေါ်းမြို့မြို့များ
사까롱먀 숙사목

텐줄	ခက်တိုး
	taesjul
제거	မြတ်ခြင်း
	jegeo
실	အင်ရှည်ခြင်း
	sil

묶은 후 자른
mukk-eun hu jaleun
ခုပုံးခုပုံးခေါ်းခါ်းခြင်း
치뿌나ဋ္ဌပါခါ

소독	ပိုးသတ်ခြင်း
	sodog

견치

ခွဲး

포유

ပိုးဖြတ်ခြင်း

상처

အန်

sangcheo

방지

ကော်မြို့ခြင်း

bangji

8개

ဇေဇ်ပေါ်း

yeodeolbgae

8개ခွဲး

송곳니

အံသွား

song-gosni

안파

잘라 줌

ပြတ်ပေါ်ခြင်း

jalla jum

팻뻬이ခါ

▶ 환돈방을 완료한 후에는 견치기를 소독하여 사용

ଓঁগ্রন্থেৱাৰ্তাৰ্পিৎফোক বৃহাঃপ্রতিষ্ঠানীর্বিভাগী দ্বিঃবৰ্তপ্রিৎ আবধ়প্রোণিঃ
ওঁচাস্বাউলুনাউ ফ্রেটমুকুর্যাগো লোদ্ধুলু অলংকুৰ

▶ 견치 요령은 손바닥으로 자돈의 머리를 고정한 후 검지손가락으로 입을 벌리고 전체 이빨의 노란 부분의 끝부분을 수평으로 절단

သွားဖြတ်သည့်နည်းများလက်ဖော်ပြုခြင်း၊ ဝက်သားပေါက်ပြီးခေါင်းကို ထိန်းထားပြီးနောက် လက်ညွှန်ပြုခြင်း၊ ပါးစိစိန် ဖြုပ်ခြင်း သားသားလုပ်၏ အရိပ်ပေါင်းအပိုင်း၏ အဆုံးပိုင်းကို ရေ့ပျက်နာပြင်အပေါင်းဖြုပ်ခြင်း၊

꽈꽽밋니마 락프와핀 왓따빠웃이 우가옹꼬 텅타삐나육 락뇨핀 빠삿꼬 폐비 띄아롱이
아와야옹아빠잇 아쏭빠잉꼬 애ማ겟나빠아야 빼이페친

■ 견치의 앞쪽을 조금만 절단하여도 충분함

သွား၏အရေးပိုင်းကို အနည်းငယ် ဖြတ်လျှင်လုံးလောက်သည်။
ပါထမ်းမြတ်စွာ အမြတ်ဆင့် အမြတ်ဆင့် အမြတ်ဆင့်



〈경치기 소동〉



〈뾰족한 부부만 자를〉



〈절제히 잘라내 솔고니〉

သွားဖတ်သည့်ကိရိယာပိုးသတ်ခြင်း
နာဖော်ကြော်ခြင်း

ချွန်ထက်သောအပိုင်းကို ဖြတ်ခြင်း
춘ቴထဲမှာ ပါမ်းမှု ဖြစ်ပါသည်။

သင့်တော်ရုံဖြတ်ထားသောအံသွား
lettter 용펫타더안똬

주의 사항

သတိပြုရန်အချက်
ထဲထဲပေါ်လာမယ့်အခြေ

▶ 치아를 잇몸에 바짝 붙여서 자르면 잇몸 손상을 일으켜 치주염을 일으키거나 연쇄상구균 감염증의 원인이 됨

သွားဖြတ်ရာတွင် သွားဖို့နှင့်ကပ်ပြီးဖြတ်လျှင် သွားစုံပျက်စီးခြင်း၊ ကွင်းဆက်ပုံ ပိုးမျိုး ကူးစက်ခြင်း၏ အကြောင်းအရင်အဖြစ်သိသော်။

꽈페야두! 꽈풀님까뻬페리! 꽈풀뽀신치 꾸쌩뽀 뽀묘꾸쌩친이 아짜옹아인 꽃띠

▶ 경치 도구의 적당부가 무덕 상태라면 즐시 교체함

သွားမြတ်သည်ကိရိယာ၏ လုသွားတံ့ဌနေလျင် ချက်ချင်း လဲလှယ်ရန်

꽈페떴끼리야잇 뒤꽈뚱네이린 챙친 레이레이

▶ 겹치는 도구는 스테이레스로 된 것을 사용(높이 스는 척로 된 나퍼는 사용금지)

စတီးမြိုင်ပြုလုပ်ထားသော သူးမြတ်သည်ကိရိယာကိအသံပြုခြင်း(သရေးတက်နေသည်သပ်အသံမပြုခြင်း)

스디프뿌룩타뙤뙤꽝띨 끼리야꼬 아똥뿌치(땃체땃네이띨 낳아 똥므뽀야)

▶ 견치 절단기는 청결한 것을 사용

သန်ရှင်းသော ဘွဲ့ဖြတ်သည့်တိရိယာကိုအသုံးပြုခြင်း

땃신띠 땅ဧဧ끼릿야꼬 아뚱뿌친

▶ 절단기보다 같아 내는 연마기를 사용하는 것이 더 안전함

ဂိုင်းဖြတ်သည့်တိရိယာထက် အမူန်ပြုလုပ်သောစက်ကို အသုံးပြုလျှင် ပိုအဆ္စရာယ်ကောင်းသည်။

ပါးအိပ်ဧဧ끼릿ယော အမဲ့ပြုပြုပေး အမဲ့ပြုပြုပေး အမဲ့ပြုပြုပေး

6. 기타 약제 투여(선택사항)

၆။ အမြှေးဆေးပစ္စည်းထည့်ခြင်း(ရွှေးချွေးနိုင်)
차혹 아차새빈시벳친(야외체나잉)

▶ 구강과 관련된 일련의 작업 후 AR예방을 위한 비강분무(가나마이신 : 1~2cc)

및 바이콕스(또는 톨트라주릴 등) 경구 투여

ခံတွင်းနှင့်သာက်ဆိုင်သောကိစွဲပြုလုပ်ပြီးနောက် ARကာကွယ်ရန်အတွက်

နာခေါင်းဆေးနှင့်ခြင်း(Kanamycin:1-2cc)နှင့် Baycox(Toltrazurilအရှို့သာဖြင့်)ဆေးသွင်းခြင်း

칸ດိုးသာက်ဆိုင်သောကိစွဲပြုလုပ်ပြီးနောက် ARကာကွယ်ရန်အတွက်
ပြ-နှိုးနှိုးနှိုးနှိုး(Kanamycin:1-2cc)နှင့် Baycox(Toltrazurilအရှို့သာဖြင့်)ဆေးသွင်းခြင်း



〈주사용 항생제 비강분무(AR 예방)〉

ဆေးထိုးရောတ်အသုံးပြုသည့် နာခေါင်းနှင့်သာက်
ပြုခြင်းဆေး(AR ကာကွယ်ဆေး)

세토아린아뚱뿌밋 나카웅판밋 빠니지와세
(에이알까꾀세이)

〈경구투여(콕시듬 예방 및 치료)〉

သောက်ဆေး(Coccidium ဘာကွယ်ခြင်းနှင့် ကုသာခြင်း)

따웃세(컥시디움까꾀친ning 꾸따친)

7. 꼬리 자르기(단미)

၇။ အမြှေးဖြတ်ခြင်း
쿤 아미펫친

목 적

ရည်ရွယ်ချက်
이외첫

▶ 밀집 사육시 나타나는 꼬리를 무는 현상으로 인한 출혈과 감염 예방

ဝက်ခြုံကြုံးလျှင် အမြှေးကို အချင်းချင်းကိုကိုခြင်းကြောင့် သွေးထွက်ခြင်းနှင့် ရောဂါဏ်းပက်ခြင်းမှ
ကာကွယ်စေရန်

윗찬찐린 아미꼬 아чин친꼬잇친짜웃 띠ဿ진NING 영아꾸셋친마 까꾀세안

단어모음 စောင်းများ စွဲတွေ့
사까롱먀 숙시묵

청결한 것

cheong-gyeolhan geos

သန်ရှင်းသော

ပန်ဖိုအယ်

အသုံးပြုခြင်း

sayong

အမဲ့ပြုပြုပေး

연마기

yeonmagi

အသုံးပြုပေး

anjeonham

သန်ရှင်းသော

비강분무

bigangbunmu

နာခေါင်းဆေး

바이콕스

baikogseu

အမဲ့ပြုပြုပေး

경구 투여

gyeong-gu tuyeo

သောက်ဆေး

파웃세တိုင်

꼬리

kkoli

အမိုး

자르기

jaleugi

အမိုး

무는

muneun

ကိုက်သည့်

출혈

chulhyeol

ပြောင်း

예방

yebang

ကိုက်သည့်

▶ 출생 후 6시간에서 2일령 전에 실시하나 작업의 효율상 3일령에도 실시

데일리포트: 헤아리기 전 1주일간은 출생 2주일 전에 해야 한다는 원칙이 있다. 특히 아미노산과 같은 영양소가 출생 후 2주일 동안 빠르게 소진되는 경우, 출생 후 2주일 전에 해야 한다는 원칙이다.

▶ 차육나이에 맞는 나이에 맞는 친환경 목사운전 또 다른 통안잇야락 뾰까옹세이안 뚝 약간의 목사운전

꼬리 절단 방법

아미노산: 1.5~2.5cm
아미노산: 1.5~2.5cm

▶ 혀약자돈 제외

제외: 헤아리기 전 1주일간은 출생 2주일 전에 해야 한다는 원칙이다.

제외: 헤아리기 전 1주일간은 출생 2주일 전에 해야 한다는 원칙이다.

▶ 꼬리의 표피를 둔부 쪽으로 당기면서 꼬리를 1.5~2.5cm정도 남기면서 절단(표피가 느슨해지면서 꼬리의 절단부위를 덮게 됨. 잘못하면 절단 후 뼈가 보임)

제외: 헤아리기 전 1주일간은 출생 2주일 전에 해야 한다는 원칙이다.
제외: 헤아리기 전 1주일간은 출생 2주일 전에 해야 한다는 원칙이다.
제외: 헤아리기 전 1주일간은 출생 2주일 전에 해야 한다는 원칙이다.

제외: 헤아리기 전 1주일간은 출생 2주일 전에 해야 한다는 원칙이다.
제외: 헤아리기 전 1주일간은 출생 2주일 전에 해야 한다는 원칙이다.
제외: 헤아리기 전 1주일간은 출생 2주일 전에 해야 한다는 원칙이다.

▶ 자른 꼬리의 길이는 전부 같도록 일정하게 절단(길이의 변이가 있어도 꼬리물기를 유발하는 요인이 될 수 있음)

제외: 헤아리기 전 1주일간은 출생 2주일 전에 해야 한다는 원칙이다.
제외: 헤아리기 전 1주일간은 출생 2주일 전에 해야 한다는 원칙이다.

제외: 헤아리기 전 1주일간은 출생 2주일 전에 해야 한다는 원칙이다.

▶ 주로 단미용 가스단미기 사용

제외: 헤아리기 전 1주일간은 출생 2주일 전에 해야 한다는 원칙이다.

제외: 헤아리기 전 1주일간은 출생 2주일 전에 해야 한다는 원칙이다.



〈가스단미기〉

제외: 헤아리기 전 1주일간은 출생 2주일 전에 해야 한다는 원칙이다.
제외: 헤아리기 전 1주일간은 출생 2주일 전에 해야 한다는 원칙이다.



〈꼬리 자를 부위〉

제외: 헤아리기 전 1주일간은 출생 2주일 전에 해야 한다는 원칙이다.
제외: 헤아리기 전 1주일간은 출생 2주일 전에 해야 한다는 원칙이다.



〈꼬리절단기의 위치〉

제외: 헤아리기 전 1주일간은 출생 2주일 전에 해야 한다는 원칙이다.
제외: 헤아리기 전 1주일간은 출생 2주일 전에 해야 한다는 원칙이다.



〈절단후의 소독〉

제외: 헤아리기 전 1주일간은 출생 2주일 전에 해야 한다는 원칙이다.
제외: 헤아리기 전 1주일간은 출생 2주일 전에 해야 한다는 원칙이다.

단어모음

제외: 헤아리기 전 1주일간은 출생 2주일 전에 해야 한다는 원칙이다.
제외: 헤아리기 전 1주일간은 출생 2주일 전에 해야 한다는 원칙이다.

꼬리	제외: 헤아리기 전 1주일간은 출생 2주일 전에 해야 한다는 원칙이다.
kkoli	제외: 헤아리기 전 1주일간은 출생 2주일 전에 해야 한다는 원칙이다.
절단	제외: 헤아리기 전 1주일간은 출생 2주일 전에 해야 한다는 원칙이다.
jeoldan	제외: 헤아리기 전 1주일간은 출생 2주일 전에 해야 한다는 원칙이다.
방법	제외: 헤아리기 전 1주일간은 출생 2주일 전에 해야 한다는 원칙이다.
bangbeob	제외: 헤아리기 전 1주일간은 출생 2주일 전에 해야 한다는 원칙이다.
허약자돈	제외: 헤아리기 전 1주일간은 출생 2주일 전에 해야 한다는 원칙이다.
heoyajadon	제외: 헤아리기 전 1주일간은 출생 2주일 전에 해야 한다는 원칙이다.
제외	제외: 헤아리기 전 1주일간은 출생 2주일 전에 해야 한다는 원칙이다.
je-oe	제외: 헤아리기 전 1주일간은 출생 2주일 전에 해야 한다는 원칙이다.
표피	제외: 헤아리기 전 1주일간은 출생 2주일 전에 해야 한다는 원칙이다.
pyoppi	제외: 헤아리기 전 1주일간은 출생 2주일 전에 해야 한다는 원칙이다.
1.5	제외: 헤아리기 전 1주일간은 출생 2주일 전에 해야 한다는 원칙이다.
iljeom-o	제외: 헤아리기 전 1주일간은 출생 2주일 전에 해야 한다는 원칙이다.
2.5	제외: 헤아리기 전 1주일간은 출생 2주일 전에 해야 한다는 원칙이다.
ijeom-o	제외: 헤아리기 전 1주일간은 출생 2주일 전에 해야 한다는 원칙이다.
일정	제외: 헤아리기 전 1주일간은 출생 2주일 전에 해야 한다는 원칙이다.
iljeong	제외: 헤아리기 전 1주일간은 출생 2주일 전에 해야 한다는 원칙이다.

출생 2 일령 (주로 토요일)

체온: 37.5°C (体温: 37.5°C)
폐쇄식(아투뜨핀 스네이네이)

고르기(양자) 분리이유
출생: 00:00:00
폐쇄식(아투뜨핀 스네이네이)

■ 분만 후 3~4회 이상 포유 후 양자보냄

(초유를 섭취하지 않으면 병원체에 감염되어 폐사 위험 존재. 양자를 실시하는 경우도 초유를 충분하게 섭취한 후에 실시)

체온: 37.5°C (体温: 37.5°C)
폐쇄식(아투뜨핀 스네이네이)
폐쇄식(아투뜨핀 스네이네이)
폐쇄식(아투뜨핀 스네이네이)
폐쇄식(아투뜨핀 스네이네이)

폐쇄식(아투뜨핀 스네이네이)
폐쇄식(아투뜨핀 스네이네이)
폐쇄식(아투뜨핀 스네이네이)
폐쇄식(아투뜨핀 스네이네이)

■ 생후 48시간 이내에 실시하고, 늦어도 3일 이내에 실시

체온: 37.5°C (体温: 37.5°C)
폐쇄식(아투뜨핀 스네이네이)
폐쇄식(아투뜨핀 스네이네이)

■ 자돈을 체중 및 포유두수로 분류

체중: 3kg (体重: 3kg)
체중: 3kg (体重: 3kg)
체중: 3kg (体重: 3kg)

■ 저산차는 체중이 작은 자돈을, 고산차는 큰 체중의 자돈을 양자 보냄

체중: 3kg (体重: 3kg)
체중: 3kg (体重: 3kg)
체중: 3kg (体重: 3kg)

체중: 3kg (体重: 3kg)
체중: 3kg (体重: 3kg)

■ 진급양자 및 산자수가 많을 경우 대리모돈 활용

체온: 37.5°C (体温: 37.5°C)
체온: 37.5°C (体温: 37.5°C)
체온: 37.5°C (体温: 37.5°C)

■ 대리모돈은 도태 계획이 있는 모돈을 주로 활용

체온: 37.5°C (体温: 37.5°C)
체온: 37.5°C (体温: 37.5°C)
체온: 37.5°C (体温: 37.5°C)

단어모음 စက္ခားများ စွဲများ
사까롱마 숙시목

출생	ဇူလိုင်မြိုင်
chulsaeng	ပျော်ဖြန့်
2	နှစ်
i	ငါ
일령	ဇူလိုင်မြိုင်ခါဝအီယံ
illyeong	ပျော်ဖြန့်ကာအာဂျာ
포유	နှုတိရိုင်
poyu	녹파의친
보냄	ပိုးဆောင်မြိုင်
bonaem	ပါးဆောင်
체중	အသေးစိန်
cheung	အရေးအနှစ်
포유두수	နှုတ်ဖြည့်ပြည့်ဝါဝါမြိုင်
poyudusu	녹파의밋ဗျာ
분류	မြို့မြို့မြို့
bunlyu	ကြော်ခြား
저산	ဇော်
jeosan	ပေါ်သည့်အကောင်မြို့မြို့
	ပျော်ဖြန့်အကောင်
작은	ဇော်သော
jag-eun	မံော်
자돈	တိုဘာဆိုရို
jadon	ခုတ္တာပေး
고산차	ဇော်
gosancha	ပေါ်သည့်အကောင်မြို့မြို့
	ပျော်ဖြန့်အကောင်
큰	ဇုံးဘာ
keun	ခြား
대리모돈	အရှားကု
daelimodon	အယားကု

출생 3일령 (주로 월요일)

1. 철분주사 및 치료

철분주사 및 치료, 거세, 이각

သုတေသနများ၊ ပြည်တွင် အမှတ်အသေး ပြုလိုက်ခြင်း
ရှိသော နာဂတ်အမှတ်အသေး ပြုလိုက်ခြင်း
ပါတယ်။

■ 분만 후 3일 이내 철분주사(덱스트란 철) 실시($100\text{mg} = 1\text{cc} = 1\text{ml}$)
嘱咐: ৰণ্ডল আগুন: বংশোদ্ধম দেওয়া (Iron Dextran) দিয়ে দেওয়া: ($100\text{mg} = 1\text{cc} = 1\text{ml}$)
퇴폐 동약야된 딴딴토세이(아이언 텍스트란) 투친 (뜨야미리그램 = 뜨시시 = 뜨미리리다)

■ 필요시 허약자돈에 복강주사 실시, 전해질을 첨가한 물 공급

로아린 치네잇네이떠왓따빠욱아 박된새토빼친, 이락토로햇타떠앤탏욱빠인빼이친

■ 자돈 설사는 되도록 돈방 단위로 치료

ဝက်သားပေါက်များ ဝမ်းလျှောက်၍ ဝက်ခြံအလိုက် ကုသပေးခြင်း
ခဲ့ဖြစ်ပါသည်။

철부제제의 종류와 사용법

သံတော်ဆေးအမျိုးအစာနှင့် အသုံးပြနည်း
 따땃္စီအော်မှုအဖွဲ့ အတွက်

■ 주사제 장단점 : 가격저렴, 비타민E 부족시 철분 쇼크

▶ 뎅스트란 철 : 3일령과 10일령에 1ml씩 2회 주사

Dextran ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ॥ ପେରିଙ୍ଗୁଳିପ୍ରିସ୍ ବ୍ୟାର୍ଗନ୍ ଫଣ୍ଡ 1ml କି କ୍ଲିନିକଲ୍ ହେଲ୍ ଡିପ୍ଲୋମାଇଟିକ୍ ଏତେବେଳେ ଏହାର ପରିପାଦାନାମ ହେଉଥିଲା ।

▶ 텍스트란 철 + 비타민ADE : 3일령에 2ml 1회 주사


Dextran ସେବାର୍ଥୀ ପିତାମାର୍ଦ୍ଦ ଆର୍ଡେ : ଡେଲାର୍ଜୁଗ୍ରେଂଜ୍ ରେଫର୍ନ୍‌ଟ୍ୱୁଳ୍ 2ml ଅନ୍ତର୍ଭିତ୍ତିକାରୀ ପାଇଁ ପାଇଁ ପାଇଁ

단어모음	00000-00000-00000 사카루릉 마숙시목
출생	00000-00000-00000 빠우파친
chulsaeng	
3 일령	00000-00000-00000 빠우파빠동양
sam-illyeong	
철분주사	00000-00000-00000 딴따아세이도
cheolbunjusa	
치료	00000-00000-00000 꾸파친
chilyo	
거세	00000-00000-00000 외이띤친
geose	
이각	
igag	
나루아맛아따뿌록진	00000-00000-00000 나루아맛아따뿌록진
복강주사	00000-00000-00000 바익된세이토진
boggangjusa	
물	00000-00000-00000 애
mul	
공급	00000-00000-00000 타옥불인진
gong-geub	
둔방	00000-00000-00000 왓찬
donbang	
단위	00000-00000-00000 유늬
dan-wi	
10일령	00000-00000-00000 빠우파빠 새약
sib-illyeong	
1ml	00000-00000-00000 딱미리
ilmilliliteo	
2회	00000-00000-00000 닉제인
ihoe	
2ml	00000-00000-00000 닉미리
imilliliteo	
1회	00000-00000-00000 뜨찌이
ilhoe	

▶ 절개된 부위로 고환을 밀어낸 뒤 이것을 약간 잡아당겨 면도칼로 제거(고환을 너무 세게 잡아 당기지 않도록 조심: 상처부위로 창자가 빠져 나와 폐사)

ဖြတ်ထားသွေ့အပိုင်းမှ ဝေးစောက်တွန်းထဲတိပြီးနောက် အနည်းငယ်ဆွဲထဲတိပြီး မှတ်ဆိတ်ရိတ်ခါးဖြင့် ထဲတိယူခြင်း(ဝေးစောက် အလွန်အားပြင်းစွာ မဆွဲယူမိစေရန်သတိထားရင်၊ အနာမှတစ်ဆင့် အူထွေက်လာပြီး ထဲတိယူခြင်း)

팟타딧아빠인마 외이세이뜬톡삐나육 아네잉애 쇠톡삐 목째의였다핀 톡유친(외이세)
이꼬 아릉아뻔솨 므쇠유미세이얀 드띠타얀, 아나맛드싯 우툇라뻬 톳유친



〈거세부위 및 고화제거〉

ଦେବିରୁଷାମନ୍ଦିର ପାଇଁ କାହାରୁ
ଦେବିରୁଷାମନ୍ଦିର ପାଇଁ କାହାରୁ

▶ 소독약을 뿌림 : 7일령 이후에 실시할 경우에는 상처부위가 커져 염증이 발생할 우려가 있으므로 소독을 철저히 학

뽀딴세이판친, 빠웃파빠쿠느얏짜빠나우 뾰록떳아챈된 아나찌툐라빠 야옹앤나이떳아
뒷 뾰딴야

■ 혼자 또는 거세 보정틀 이용한 거세 그림

დესარტი დესარტი დესარტი



〈거세 보정틀 이용한 거세〉 ዶေးသင်းသည့်ဘောင်ဂိုအသုံးပြ၍ ဒေသင်းသော်လုပ်ချင်မှုများ
와이띠띠 바운즈 아在过渡와 와이띠띠뿐



<거세> ခြေးသင်းခြင်း 외이띤친

단어모음	ଓଡ଼ିଆରୁ ଓଡ଼ିଆରୁ
사카루ମା	ଶକ୍ରମା ଶକ୍ରମା
고화	ଗୋହାର
gohwan	ଗୋହାର
면도칼	ମେନ୍ଦୋକାଲ
myeondokal	ମେନ୍ଦୋକାଲ
제거	ଜେଗୋ
jego	ଜେଗୋ
상처부위	ଶଂତ୍ରବ୍ୟବୀର୍ଣ୍ଣି
sangcheobuwii	ଶଂତ୍ରବ୍ୟବୀର୍ଣ୍ଣି
소독	ସୋଦୋଗ
sodog	ସୋଦୋଗ
철저히	ଚେଲ୍ଜେହି
cheoljeohi	ଚେଲ୍ଜେହି
보정틀 이용	ବୋଜେଂଟ୍ରିଆଇଂଗ
bojeongteul iyang	ବୋଜେଂଟ୍ରିଆଇଂଗ
여이면띤바우꼬	ଏଇମେନ୍ଦିବ୍ୟବୀର୍ଣ୍ଣି
외이면띤바우꼬	ଏଇମେନ୍ଦିବ୍ୟବୀର୍ଣ୍ଣି
거세	ଗେଝେ
geose	ଗେଝେ



<2인 1조 거세>

ֆուլեյակորտածնց, ըստավճակնից:
նկատաբար պահանջման ժամանակ:



<무보정 거세>

ջանձն ըստավճակնից:
պահանջման ժամանակ:



<보정구 이용 거세>

օգուտավախունդաշանչական պահանջման ժամանակ:
պահանջման ժամանակ:

단어모음 տուանիպաքա գուանիպա
사까롱마 숙시목

이각


igag
ֆայզունաբարտահապականիթին:
նկատաբար պահանջման ժամանակ:

개체표시

gachepposi
տանգիթաբարտահապականիթին:
դրկութիւն պահանջման ժամանակ:

3. 이각: 필요시 개체표시 방법

ֆա: տցունաբարտահապականիթին:
|| տանգիթի պահանջման ժամանակ:
նկատաբար պահանջման ժամանակ:



<이각법(193법)>

ֆա: տցունաբարտահապականիթին: (օճառականին:
նկատաբար պահանջման ժամանակ:
նկատաբար պահանջման ժամանակ:

<이각기>

ֆա: տցունաբարտահապականիթին:
նկատաբար պահանջման ժամանակ:

4. 견치(송곳니)제거 및 비강분무, 꼬리 자르기(단미)

၄။ ဘွား(အံဘွား)ဖယ်ထုတိခြင်းနှင့်
နှာခေါင်းဆေးဖုန်းခြင်း၊ အမြဲးဖြတ်ခြင်း
ရေးပါ(안파)페특친 니 나카웅세이
파친 아미파친

■ 농장에 따라 분만 직후에 또는 업무의 효율상 월요일에 철분주사와 같이 실시
예: 류마티스마를 예방하기 위해 철분주사를 주는 경우 등은 월요일에 철분주사를 실시하는 경우가 많다.

사료에 대한 호기심 자극
017-743-8817 | 웹사이트: www.yes24.com
왓챠히어하세요

- 거세를 화요일(약 4일차)에 나누어 할 수 있으나 단미, 견치, 거세를 철제주사와 동시에 월요일에 실시하면 능률적임

ଦୋଷରେ ପାଇଲୁଛି କି ଆମୀଙ୍କୁ ଦୁରଗତିରେ ଫେରିବାକୁ ପାଇଲା ଏହାରେ କିମ୍ବା କିମ୍ବା ଦୋଷରେ ପାଇଲୁଛି କି ଯିବୀଠିରେ କିମ୍ବା କିମ୍ବା

외이면친고 잉가네이(레이잇따웃네이)된 죄빼이록야떠레이 아미펫친, 뻬, 외이면친꼬 딴딴토세이닉아또 따닝라네이 뛰뿜로린 뽀아쪼시디

출생 5일령 (주로 수요일)

입질사료 훈련

■ **사료의 신선도 및 급이기를 청결하게 유지**
 အစာ၏ လတ်ဆက်မှုနှင့် သန်၏ရှင်းမှုကို ထိန်းတိမ်းခြင်း
아사잇렉사무너답신무꼬 텅떼친

단어모음	ଓଡ଼ିଆରୁଙ୍ଗାରୁ ଦ୍ୟାନ୍ତିରୁ
사카롱마	ଶକାରଙ୍ଗମା ସିଶିମୁ
견치	ଜ୍ଯୋତିଷ
gyeonchi	ପା
제거	ହେଲ୍ପାର୍ଟିସ୍
jegeo	ଫେଶାଚି
꼬리	ଓଟିପ
kkoli	ଆମି
자르기	କ୍ରିଟିଭ୍
jaleugi	ଫେଚି
출생	ହେଲ୍ପିଗ୍ରୁହିଂସ
chulaeng	ବ୍ୟୋପାଚି
4일령	ହେଲ୍ପିଗ୍ରୁହିଂସ ଦ୍ୟାନ୍ତିର୍କାଳ
saillyeong	ବ୍ୟୋପାଚି ଲେଇଟକାଳ
5일령	ହେଲ୍ପିଗ୍ରୁହିଂସ ଦ୍ୟାନ୍ତିର୍କାଳ
oillyeong	ବ୍ୟୋପାଚି ଉଣ୍ଠାଇଏଇକାଳ
월요일	ତାହାର୍ଲାକ୍ସ
wol-yoil	ଫିନିରାନୀ
화요일	ଅରିଫ୍କୁ
hwayoil	ଇଂଗାନେଇ
입질	ଖୁର୍ବିର୍କ୍ଷିତ୍
ibgil	ହୋମାଚି
청결	ଅଛିନ୍ଦିର୍କ୍ଷିତ୍
cheong-gyeol	ଫିର୍ମିଚିନ୍ତିନ୍ଦିତ୍
유지	ଟେଇନିଂର୍କ୍ଷିତ୍
viji	ଟେମ୍ପାଚି

■ 설사 시 탈수 예방을 위해 전해질제를 급여

0정: 대체로 대량의 배설로 인해 체내에 물과 무기질이 손실되는 경우입니다.
맞아야된 애당송송미고 까괴세이 양 이락토로 죄친

■ 자동용 워터컵을 설치하여 신선한 물을 충분히 섭취할 수 있도록 조치

인정: 환자에게 물을 충분히 섭취하는 방법입니다. 물은 체내에 수분과 무기질을 공급하는 역할을 합니다.

맞아빠육통 애랫꼬 땃신빼 락삭펴 애따육나이세이 양 뺏록친

출생 7일령 (주로 금요일)

별도로 주사: 7일령 (아목: 암: 100mg = 1cc = 1ml)
빼육피빼코느앗(아마마민 따육짜네이)

철분주사, 백신

별도로 주사: 7일령 (아목: 암: 100mg = 1cc = 1ml)
딴단토세이, 까괴세이

■ 분만 후 7일경 2차 철분주사(넥스트란 철) 실시(100mg = 1cc = 1ml)

증상: 철분주사가 주입되는 과정에서 철분이 혈액에 퍼져나온다. 철분은 철분주사로 주입되는 철분과 혈액에 퍼져나온 철분의 합계로 계산된다.

처치: 철분주사를 주입하는 과정에서 철분이 혈액에 퍼져나온다. 철분은 철분주사로 주입되는 철분과 혈액에 퍼져나온 철분의 합계로 계산된다.

■ 비타민ADE 주사

증상: ADE 태아: 100mg = 1cc = 1ml

처치: 비타민 ADE 주사

■ 필요시에는 허약자돈에 복강주사를 실시하고 전해질을 첨가한 물 공급

증상: 철분주사가 주입되는 과정에서 철분이 혈액에 퍼져나온다. 철분은 철분주사로 주입되는 철분과 혈액에 퍼져나온 철분의 합계로 계산된다.

처치: 철분주사를 주입하는 과정에서 철분이 혈액에 퍼져나온다. 철분은 철분주사로 주입되는 철분과 혈액에 퍼져나온 철분의 합계로 계산된다.

■ 견치, 단미, 거세를 하지 않은 개체에 대한 시술

증상: 철분주사가 주입되는 과정에서 철분이 혈액에 퍼져나온다. 철분은 철분주사로 주입되는 철분과 혈액에 퍼져나온 철분의 합계로 계산된다.

처치: 철분주사를 주입하는 과정에서 철분이 혈액에 퍼져나온다. 철분은 철분주사로 주입되는 철분과 혈액에 퍼져나온 철분의 합계로 계산된다.

■ 유질 관련 소화기 질병, 콕시듐증 관찰

증상: 철분주사가 주입되는 과정에서 철분이 혈액에 퍼져나온다. 철분은 철분주사로 주입되는 철분과 혈액에 퍼져나온 철분의 합계로 계산된다.

처치: 철분주사를 주입하는 과정에서 철분이 혈액에 퍼져나온다. 철분은 철분주사로 주입되는 철분과 혈액에 퍼져나온 철분의 합계로 계산된다.

■ 백신 실시(선택사항)

증상: 철분주사가 주입되는 과정에서 철분이 혈액에 퍼져나온다. 철분은 철분주사로 주입되는 철분과 혈액에 퍼져나온 철분의 합계로 계산된다.

처치: 철분주사를 주입하는 과정에서 철분이 혈액에 퍼져나온다. 철분은 철분주사로 주입되는 철분과 혈액에 퍼져나온 철분의 합계로 계산된다.

단어모음

0정: 대체로 대량의 배설로 인해 체내에 물과 무기질이 손실되는 경우입니다.

사까롱먀 숙시목

전해질제: 철분주사로 주입되는 철분과 혈액에 퍼져나온 철분의 합계로 계산된다.

jeonhaejilje

급여: 철분주사로 주입되는 철분과 혈액에 퍼져나온 철분의 합계로 계산된다.

geub-yeo

신선한 물: 철분주사로 주입되는 철분과 혈액에 퍼져나온 철분의 합계로 계산된다.

sinseonhan mul

출생: 철분주사로 주입되는 철분과 혈액에 퍼져나온 철분의 합계로 계산된다.

chulsaeng

7일령: 철분주사로 주입되는 철분과 혈액에 퍼져나온 철분의 합계로 계산된다.

chil-illeyeong

철분주사: 철분주사로 주입되는 철분과 혈액에 퍼져나온 철분의 합계로 계산된다.

cheolbunjusa

백신: 철분주사로 주입되는 철분과 혈액에 퍼져나온 철분의 합계로 계산된다.

baegsin

비타민ADE: 철분주사로 주입되는 철분과 혈액에 퍼져나온 철분의 합계로 계산된다.

bitamin ADE

허약자돈: 철분주사로 주입되는 철분과 혈액에 퍼져나온 철분의 합계로 계산된다.

heoyagjadon

복강주사: 철분주사로 주입되는 철분과 혈액에 퍼져나온 철분의 합계로 계산된다.

boggangjusa

전해질: 철분주사로 주입되는 철분과 혈액에 퍼져나온 철분의 합계로 계산된다.

jeonhaejil

공급: 철분주사로 주입되는 철분과 혈액에 퍼져나온 철분의 합계로 계산된다.

gong-geub

소화기: 철분주사로 주입되는 철분과 혈액에 퍼져나온 철분의 합계로 계산된다.

sohwagi

질병: 철분주사로 주입되는 철분과 혈액에 퍼져나온 철분의 합계로 계산된다.

jilbyeong

관찰: 철분주사로 주입되는 철분과 혈액에 퍼져나온 철분의 합계로 계산된다.

gwanchal

백신: 철분주사로 주입되는 철분과 혈액에 퍼져나온 철분의 합계로 계산된다.

baegsin

이유+1일(주로 목요일)

자돈의 젖 떼기와 분만 돈방 물세척 실시

ဝက်သားပေါက်၏ နှစ်ဖြတ်သွေ့နှင့်
သားပေါက်၏ ဆေးကြောခြင်း လုပ်ငန်း
왓따ပျော် နဲ့ ပုံမှန် ဖော်လုပ် ပေါ်လုပ် ပေါ်လုပ်

■ 주간관리에 의해 매주 목요일 오전에 이유 실시

■ 이유 전 이동 통로를 점검

କ୍ଷି. ମଣ୍ଡଳି ପ୍ରେସ୍‌ରେ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ଉପରେ ଏହାରେ ଛାପିଛି

■ 이동통로에 호기심 유발물질을 모두 제거

**ဧရာဝတီမြို့နယ်လမ်းကြောင်းတွင် အာရုံစိုက်စေနိုင်မည့် ဖွံ့ဖြိုးများအားလုံးဖယ်ရှားခြုံး
ပေးပို့ဆိုလိုက်ရသူများအတွက် အသုတေသနများများအတွက် အသုတေသနများများအတွက်**

■ 칸막이를 설치하여 뷰티사에서 이유 자동차로 바로 입식되도록 유도

အကာတ်ဆင်ပြီး သားမွားမှုမှ နိုးသည့်သားပေါက်ခြုံသို့ တိုက်ရှိက်ဝင်အောင် လမ်းညွှန်
အယာတ် ပေါက်ခြုံသို့ တိုက်ရှိက်ဝင်အောင် လမ်းညွှန်

■ 전입도방 보호등을 미리 켜 두어 실내 온도를 높여줌(28~32°C)

ဝင်ရောက်သည့်ဝက်ခြေတွင် အပူပေးသည့်မီးကို အရင် ဖွင့်ထားပြီး အနေးတွင် အပူချိန်ကိုမြင့်ပေးရန်(28~32 °C)

원양밋잇찬된 아뿌뻬이밋미꼬 아인 훈따뻬 아간된아뿌첸꼬 민뻬이얀 느세이샤잇~뚱
셋넉디그리신디그락

■ 이유자돈 치료

ଫିଲ୍ ପାଇଁ କରିବାର ପାଇଁ

■ 이유 방법 : 올인 올아웃 권장, 한 돈방에 가능한 한 배새끼 단위로 전입

နိုင်ငံတော်လမ်း၊ အားလုံးပိုင်အားလုံးထွက်ခြင်းကိုအားပေးသည့်။ ဝက်ခြုံတစ်ခြုံတွင်ဖြစ်နိုင်ပျော်အတူတူမှုးသောအကောင်ကိုသွေ့ခြင်း

녹코멋니란, 아롱원아롱툇친꼬 아뻬이디, 앗찬뜨찬된핏나이린 아뚜뚜뫼여 아까옹꼬 뛴친

▶ 돈방내 개체간 체중차이가 2kg 이내로 되도록 고르기 실시(선택사항)

ဝက်ခံအတွင်း တစ်ကောင်း၏ အလေးရှိနိုင်ကြာဟမှ 2kg အတွင်းဖြစ်အောင် ရွေးရန် (ရွေးနိုင်)

월창아 뛰 뜨까 웅시잇 아레이이체파하무 낙끼로그램아 둑퍽아 웅 와이야(야와이나임)

▶ 암·수, 거세·비거세, 체중 등을 고려하여 구분 수용(선택사항)

အမှုအတိုး၊ ရေးသင်းခြင်း၊ ရေးမသင်းရသေးခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန် အစရိုသည်ဖြင့် ခွဲခြားခြင်း (ရွှေးချုပ်နှင့်)
아마, 아티, 외이띤친, 외이므띤얏페이친, 꼬아레이이친 아사신드핀 쾌차친(야외이채나임)

▶ 두당 할당되는 사료조 면적을 충분하게 조절(자유급이시(15cm/두), 제한급이시(20cm/두))

အကောင်လိုက် တားဖွံ့ဖြိုးသည့် ဝက်စွာက်၏ ဒါပ္ပာကိုထိနိုင်သိမ်းခြင်း(ကန်၏သတ်မှတ်အစာခွက်(15cm/ကောင်), ကန်၏သတ်အစာခွက်(20cm/ကောင်)

아까웅락 사동핀 왓사퀵잇 에이리야고 텹펭친(깐딱맷아사퀵(셋아신디미다/까웅), 까잇딱아사퀵(넉세신디미다/까웅)

■ 이유후 분만스톱을 고압 수세기를 이용하여 수세 후 건조 및 퍼트 비우기

କ୍ଷେତ୍ରିକ ଯାତ୍ରାରେ ପରିବହନ ଉପରେ ଆମେ ଏହାରେ ଅନୁଭବ କରିଛି



〈분만스톨 및 급이기 수세, 피트 비우기〉

သားမွေးသည့်စင်နှင့် တွေ့က် ဆေးကြောခြင်း၊ ဖော်ရှားခြင်း
တော်လီနဲ့ အနေဖြင့် ပေါ်လိုက် ဖော်ရှားခြင်း

단어모음 တော်လုံများ စုစည်းမှု 사까롱မာ 숙시묵

구분	ଓଡ଼ିଆର୍ଥିତି:
gubun	ପ୍ରଚାନ୍ତି
조절	ହେତୁବିଶ୍ଵାର୍ଥିତି:
jojeol	ତେବେଚି
고압 수세기	ଗୋବ ସୁସେଜି
goab susogi	ଏହାମାନାକୁଣ୍ଡିଲ୍ଲିତି
에야핀레이찌진	ଏଯାଫିନ୍ବୀଏଇଚିଜିନ୍
수세	ହୋଇକୁଣ୍ଡିଲ୍ଲିତି:
suse	ସେଇଚିଜିନ୍
건조	ଝାଇକୁଣ୍ଡିଲ୍ଲିତି:
geonjo	ଆଚାଉକାନ୍ତିନ୍
피트 비우기	ପାନ୍ଦିରିବିନ୍ଦିତି:
pitue juugi	ଫେଶାଚିନ୍



일상관리

နေ့စဉ်ထိန်းသိမ်းခြင်း
နေ့စဉ်ထိန်းသိမ်းခြင်း

온도 및 환기관리

**အပူချိန်နှင့် လေဝင်လေထွက်ထိန်းသိမ်းခြင်း
아뿌첸닝 레이윈레이팃텐땡친**

일상관리

နေ.စဉ်ထိန်းသိမ်းခြင်း
နောက်စဉ်

■ 사료는 1일 2회 급여. 하루에 한번은 사료통을 비울 수 있도록 적정량 급여

■ 위축돈, 환돈의 격리수용 및 적절한 치료

နှာမကျိုးသောဝက်၊ ဝက်ခြားသီးသန့်ထား၍ သင့်တော်သောကုသမ္ပါလုပ်ရန်
나무잔파와 왓, 왓찬아 띠딴타윗 뜻떠여 꾸따무뿌록안

■ 사료, 온도관리, 전해질 급여

ဝက်စာနှင့် အပူပေးသည့်မီးများ ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် electrolyte ပေးခြင်း

왓사닉 아뿌뻬이떴미야 텩떼이친닉 일렉트로라이트 빼이친

■ 회생 가능성 없는 개체의 과감한 도태

ပြန်မကောင်းနိုင်မည့် အကောင်အား ဖယ်ထွေတိခိုင်း

빤드까웅나잉및 아까웅아 페툐친

■ 니플 점검(물이 부족하면 사료섭취량이 줄고 성장률이 떨어짐)

ရေပိုက်ဒေါင်၊ စစ်ဆေးခြင်း(ရေမလုံလောက်လျှင် အစာတေးမှုလျော့ကျိုး၊ ကြီးထွားမှု လျော့ကြန်)

애빠까옹 싫쎄친(애므로라웃린 아사사무영짜뻬 찌툐무 영짜낳)

■ 음수 소독(주 1회): 급수관리기내 이물질이나 이끼 제거

သောက်ရေပိုးသတ်ခွင့်(တစ်ပတ်တစ်ကိုမှု) ရေပြေးရာတွင် အမျန်အများများနှင့် ရေညီများ ဖယ်ရှား

따울 얘 빼 땅 치(드 빠 뜬 째) 얘 빼 야 되 아 몽 아 맑 막 닥 애 이 닉 막 페 샤

■ 자동차 내에 사료 저장 지양

ဝက်သားပေါက်ခံအတွင်းတွင် အစာသိလောင်ခြင်းကို အားပေး

왈따빠울착아둬둬 아사 또락우친꼬 아빠

<니플점검>

ရေပိုက်ခေါင်း ကိုစတ်ဆေး 애빡가웅꼬 심씨



단어모음 စကားလုံးများ စုစည်းမှု 사까롱먀 숙시묵

온도	온도	온도
ondo	ondo	아卑珍
환기	환기	레이윈레이苣
hwangi	hwangi	레이윈레이苣
1일	1일	타일린
il-il	il-il	프얏
2회	2회	타이트
ilhoe	ilhoe	낫젠
급여	급여	페팅:
geub-yeo	geub-yeo	빼이친
적정량	적정량	와드온더후드:
jeogjeonglyang	jeogjeonglyang	밋페뇽
위축돈	위축돈	와우풀풀하우스원보드
wichugdon	wichugdon	나므짠腆왓
환돈	환돈	와인
hwandon	hwandon	왓찬
격리	격리	웨일리:
gyeogli	gyeogli	코차진
적절한 치료	적절한 치료	적절한 치료
jeogjeolhan chilyo	jeogjeolhan chilyo	제거제한 치료
와우온더하우스원보드:	와우온더하우스원보드:	와우온더하우스원보드:
밋并不意味마친	밋并不意味마친	밋并不意味마친
과감	과감	웨이브웨이브
gwagam	gwagam	嬖파파
도태	도태	웨이브웨이브:
dotea	dotea	페샤진
니플	니플	웨이브웨이브:
nipeul	nipeul	낫
점검	점검	웨이브웨이브:
jeomgeom	jeomgeom	싯쎄진
음수	음수	웨이브웨이브
eumsu	eumsu	따우애
소독	소독	웨이브웨이브:
sodog	sodog	嬖딱진
이물질	이물질	웨이브웨이브:
imuljil	imuljil	아닉아제
제거	제거	웨이브웨이브:
jegeo	jegeo	페토진

단어모음 စကားလုံးများ စွဲည်းမှု 사까롱먀 숙시묵

온도	온도	온도
ondō	ondō	아卑颤
관리	관리	아卑颤
gwanli	gwanli	벵촉진
체적	체적	이지
chejeog	chejeog	맞나펜
적은	적은	아卑
jeog-on	jeog-on	티아우퍼아卑颤
범위	범위	范畴
beam-wi	beam-wi	존
돈사	돈사	아리
donsa	donsa	왓찬
26	26	26
isib-yug	isib-yug	느셋자옥
30	30	30
samsib	samsib	뚱세이
°C	dossi	길이
	dossi	디그리신디그랙
22	22	22
isib-i	isib-i	느셋느
23	23	23
isibsam	isibsam	느셋퐁
유지	유지	아卑
yugi	yugi	벵벵진

■ 이유 후 2~3일간은 돈사내 온도를 $26\sim30^{\circ}\text{C}$ 로 유지 후 매주 $1\sim2^{\circ}\text{C}$ 씩 낮춤
● 온도는 2~3일마다 1~2°C씩 낮춰야 한다. 예전에는 1~2°C씩 낮춰온 경우가 많았지만 최근에는 1~2°C로 유지하는 경우가 많다.

늑코삐나옹 너~뚱양아된 앗찬아된 아뿌첸꼬 느셋자옹~뚱세이 디그리신드리래아펫
템타삐나옹 아빠시 뜨~넉 디그리시디그램시 셜차빼이치

■ 3주 후에 22~23 °C를 유지도록 조절

သုံးပတ်ကြာလျှင် 22~23 °C အဖြစ်ထိန်းထားရန်

뚱빡짜린 느셋느~느셋뚱 디그리신드리랙아핏탱타안

■ 돼지가 포개어져 뒹어리 상태로 누워 있으면 돈사가 춥다는 표시

ဝက်များ အခြင်းချင်း တစ်ကောင်ပေါ် တစ်ကောင်ထပ်ပြီး လဲနေလျှင် ခမ်းနေသည့်လက္ခဏာ

왓야 아친친 뜨까옹빼뜨까옹탓빼 레네이린 찬네이띵락크나

이유 당일 (주로 목요일)

❖ 흐늘거려
(아빠는 아파하니, 뒤집어쓰면 아파하니)
녹코띠앗(아마아핀 짜파쁘페이네이)

이유당일 관리

❖ 흐늘거려는 그림. 그림에 텡땡 달고
녹코띠앗이 뛰 텡땡 달고

사료관리

0070-0000-0000
왓사팅땡친

▶ 이유 후 최초 3일간(목, 금, 토)는 1일 5~7회로 나누어 제한 급여함
(설사를 예방하고 식욕을 자극)

❖ 흐늘거려는 그림. 아파하는 그림. 뒤집어쓰면 아파하는 그림. 아파하는 그림.
☞ 그림에 텡땡 달고 뛰는 그림. 아파하는 그림. (0070-0000-0000: 빨간색 텡땡 달고 뛰는 그림)
녹코띠앗 아파하는 그림. 짜파쁘페이, 짜파쁘페이, 짜파쁘페이, 짜파쁘페이)

구 분	사료급여 방법	3주령 이유	4주령 이유
코자친	0070-0000-0000 아사자칙	0070-0000-0000 짜파쁘페이	0070-0000-0000 짜파쁘페이
이유당일	이유 후 12시간 까지 3시간은 <u>사료급여 금지</u> ❖ 흐늘거려는 그림. 아파하는 그림. 녹코띠앗 짜파쁘페이 뚱나이 아파하는 그림. 자돈을 관찰하고 사료통이 비어 있으면 사료 추가 급여 (오후 2시, 4시, 6시에 각각 급여) 0070-0000-0000: 0070-0000-0000: 0070-0000-0000: 아파하는 그림. 아파하는 그림. 아파하는 그림. 아파하는 그림. 왓찬꼬꼬찌 웃사펫롯네이린 아사자칙 짜파쁘친 (네이래느나이, 레이나이, 차육나이피 아파하는 그림)	사료섭취량 : 30~40g/두 또는 3주령보다 1/3 증량 급여 사료섭취량 : 30~40g/두 아사사자칙 짜파쁘친 뚱나이~레이세 이그램/까옹 10두당 0.5kg 이하 급여 10kg 0.5kg 까옹 세까옹시동나파드마옹아끼로그 램아웃 죄진	사료섭취량 : 40~60g/두 또는 3주령보다 1/3 증량 급여 사료섭취량 : 40~60g/두 아사사자칙 짜파쁘친 뚱나이~레이세 이그램/까옹 아사사자칙 짜파쁘친 뚱나이~레이세 이그램/까옹 뚱나파드마옹아끼로그 램아웃 죄진
다음 2일	오전 8시 : 자돈 관찰 후 청소 0070-0000-0000: 0070-0000-0000: 모나식나이 웃찬꼬꼬찌 짜파쁘친 핀신친	사료섭취량 : 60~80g/두 아사사자칙 짜파쁘친 차육세이~사이 세이그램/까옹 10두당 0.8kg 이하 급여 10kg 0.8kg 까옹 세이까옹시동나파드마식 끼로그 램아웃 죄진	사료섭취량 : 70~100g/두 아사사자칙 짜파쁘친 쿠느세이~뜨야 그램/까옹 10두당 1.0kg 이하 급여 10kg 1.0kg 까옹 세이까옹시 끼끼로그 램아웃 죄진
3일		자돈의 상태를 면밀히 관찰 0070-0000-0000: 0070-0000-0000: 왓찬잇아체아네이꼬 아페이세잇 찌슈친	

단어모음

0070-0000-0000: 0070-0000-0000:
사까롱먀 숙시목

이유	❖ 흐늘거려 iyu
당일	❖ 흐늘거려 dang-il
1일	1 일 ig-il
5	5 o
7회	7 회 chilhoe
급여	❖ 흐늘거려 geub-yeo
3시간	3 시간 sesigan
사료	0070-0000-0000: salyo
금지	0070-0000-0000: geumji
30	30 samsib
40g	40 일 sasibgeulaem

0.5kg	0.5kg yeongjeom-0killoguelaem
0.5 키로그램	0.5 키로그램 tingnajapdamyeong a kirogram
이하	0.0000 iha
0.7	0.7 yeongjeomchil
kg	0.0000 killoguelaem
2일	2 일 iil
3일	3 일 sam-il
자돈	0070-0000-0000: jadon
상태	0070-0000-0000: sangtae
관찰	0070-0000-0000: gwanchal

입식 자돈 특별 관리

အစာကျွေးမည့်ဝက်သားပေါက် အထူးထိန်းသိမ်းခြင်း
အရာအမြတ်များ၊ အရာအမြတ်များ၊ အရာအမြတ်များ၊ အရာအမြတ်များ၊

→ 가능한 올-인, 올-아웃을 실시

ଆମେ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

▶ 한 돈방의 자돈이 동기군보다 뒤질 때 즉시 시행

▶ 물+설탕+전해질 급여 : 자돈의 탈수 방지

▶ 청결한 급여기에 신선한 용액 제공

သန်ရှင်းသော တစ္ဆောက်တွင် သန်ရှင်းသော ရေ ထောက်ပံ့ခြင်း
ဖဲ့စာ့ အသေးစိတ် ဖဲ့စာ့ အသေးစိတ်

ଲାଗ୍ନି ଆତାଗ୍ରୂହଣିକାଙ୍କୁ ଲାଗ୍ନି ମୁହଁ ଆଶୀର୍ବାଦିତ
ଲାଗ୍ନି ଆତାଗ୍ରୂହଣିକାଙ୍କୁ ଲାଗ୍ନି ମୁହଁ ଆଶୀର୍ବାଦିତ

일 수 몇 약	1 뜻	2 닛	3 똥	4 레이	5 응아	6 차옥
비 율 비율 아조아사	100:0 프야아초똥њا	80:20 샤잇세이아초 닉세이	60:40 차옥세이아초 레이세이	40:60 레이세이아초 차옥세이	20:80 넉세이아초식 세이	0:100 똥њ아아초프야

(사료교체시기는 제품의 사양권장에 따름)

(ဝက်စာလဲလှယ်သည်အချိန်သည် မွေးမြှုသည့်စနစ်အလိုက်ကြားနိုင်)

단어모음 օကားလုံးများ စွဲည်ဗျာ 사까롱먀 숙시묵

입식	အသက္ကမြိုင်
ibsig	아사찌친
자돈	ဝင်ဘာဂေါက်
jadon	왓파빠욱
특별	အထူးဖြင့်
teugbyeol	아투뜨핀
관리	ထိန်းထိန်းဖြင့်
gwanli	텐朋친
사료	အစာ
salyo	아사
교체	လဲပှေ့ဖြင့်
gyoche	래래친
사료간	ဝင်စာ
salyogan	왓사
비율	အန္တိအစား
biyul	아조아사

이유 후 + 4주 (56일령) (주로 화요일)

자돈전출 후 수세 및 소독

ଓঁ হ্যাঃ পেরিং দ্য ট্ৰি: ফোৱ লৈঃ ক্ৰাৰ্ণঃ কুণ্ডঃ
ধীঃ বা তি কুণ্ডঃ
ওয়াত্পাৰুক্তুৰুনাৱ সেই জৰুৰি ভোজন

■ 육성사로 자돈 전출

အရှင်ရောက်ဝက်ခုံမှ ဝက်ပေါ်က်အား ထုတ်ခိုင်း

아야외양왓찬마 왓빠욱아 톡친

■ 돈방 점검 및 수세, 소독, 7일 이상 건조

왓찬싱세이치닉 세이쩌친. 뽀딱친. 쿠느양아택아차웁칸친

■ 슬러리 돈사의 경우 세척 후 슬러리를 완전 제거

အညှစ်အကြော်ပေါက်နွေ့နေသောဝက်သားပေါက်ခြံမျှင် သေးတော်ပြီးနောက် အညှစ်အကြော်ကိုဖော်ရှားပေးပို့ဆိုရင်

아닛아찌마빼이짠네이떠 왓따빠웃핏린 씨이찌빠나욱 아냑아찌꼬 폐샤빼이친

■ 전입 돈방, 사료급이기 등 시설 세척 후 소독

သွင်းမည့်ဝက်ချုံ၊ ဝက်စာခွက် အစရိသည့် ပစ္စည်းများ ဆေးကြော်ပြီးနောက်ပိုးသတ်ခြင်း

뛰밍왓찬, 왓사₩ 아사싱띵 뻃시야 쎤이쩌뻬나욱뽀땄친

단어모음 ကကားလုံးများ စုစည်မှု 사까롱먀 숙시묵

전출	অর্দ্ধভূমি:
jeonchul	특유친
후	ফোর্ন
hu	나육
수세	ডেসিপ্রিণ্ট:
suse	제이চে진
소독	ধীমত্তি:
sodog	ল্যাম্চিন
육성사	আর্গুণ্ডেণ্টিলিং:
yugseongsa	আয়োথ্যায়চান
점검	টিলেন্সি:
jeomgeom	শিষ্যেইচিন
건조	অগ্রিম্বিল্ডিং:
geonjo	আচাউকিন
슬러리	অল্যুন্ডেলিং:
seulleoli	আন্দায়েলি
완전 제거	অল্যুকাস্কুলিং:
wanjeon jegeo	পেশাম্চিন
시설	ওফিস:
siscol	বেসি
세척	ডেসিপ্রিণ্ট:
secheog	শেচেচিন



04

출하관리 및 도축

၄။ ရုတုတ်ခြင်း နှင့် သားသတ်ခြင်း
레 야웅톡친닉 따딱친

출하전후 관리

ရုံးထုတ်ပောင်းရုံးထုတ်ပွဲ ထိန်းသိမ်းခွင့်
yunmtoekinnit yunotto tappengchin

돈육의 안전성 확보

ଓର୍ବାହାଃଅକ୍ଷଣ୍ୟଗନ୍ଦଃତେରକ୍ଷି
왓ତା ଅନ୍ତରେକ୍ଷିପ୍ତିଯେ

■ 출하 전 관리

ရုံမထုတ်ခင် ထိန်းသိမ်းခြင်း အောက်ပါတော်းလွှာများ

▶ 반드시 휴약 기간을 준수

କେବେଳାକିମିନ୍ଦିରେ ପାଇଁ କାହାରେ କାହାରେ କାହାରେ କାହାରେ କାହାରେ

→ 출하 6~12시간 전부터 절식

ရုထုတ်ပြီး 6~12 နာရီမတိုင်မီ အစာဖိတ်ချင်း

유통빼 차울~썩낙나이므따이미 아사팠침

■ 출하시 관리

ရုတုတ်ခိုန် ထိန်းသိမ်းခြင်း 유토체 탱때침

→ 절대로 구타 및 전기유도봉의 사용을 금함

ရှိက်နိက်ခင်းနှင့် လျပ်စစ်ပစ္စည်းဖြင့်ရှိက်ခင်းအား တားမြတ်ခင်း

양난치닝략싱뽀시핑약치아 따밍치

■ 출하 이동로 설치 및 운영

ရုတုတ်သည့်လမ်းကြောင်းတပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်း

윤튜핏란짜옹땃신친닉 텩촉친

▶ 경사를 완만하게 하고 통로에 호기심을 유발하는 물건 치움

ထိတ်လန်ခြင်းမရှိစေရန် လမ်းကြောင်းရှိ စုစုမ်းသည့်စိတ်ဖြစ်နိုင်သည့်ပစ္စည်းများအား ဖယ်ရှားခြင်း

텍락친므시세이얀 란짜웅시 수산띤舛핏나잉舛 뻣시마아 페샤친

단어모음	ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦରେ
출하 전	ଛୁଟାନ୍ତିଳି
chulha jeon	ସୁରତମି
관리	ଟିକ୍କିଲିପିନ୍ଦି
gwanli	ଟେଙ୍ଗଚିନ
도축	ହୋହାର୍ଦିଲିପିନ୍ଦି
dochug	ପାପଚିନ
휴약기간	ହୋର୍ସିଯାଲିପିନ୍ଦି
hyuyaggigan	ଜେଅଫ୍ଟାଇଚେନ
준수	ଲୀର୍ହାପିନ୍ଦି
junsu	ରାକ୍ଷଣି
절식	ଜାଗିପିନ୍ଦି
jeolsig	ଆପଚିନ
출하 시	ଛୁଟାନ୍ତିଳି
chulha si	ସୁରତନି
구타	ଖାର୍ଦ୍ଦିଲିପିନ୍ଦି
guta	ଓଟାଚିନ
금함	ହୋର୍ସିଯାଲିପିନ୍ଦି
geumham	ପାପଚିନ
이동로 설치	ଲୋକ୍କାର୍କିପିନ୍ଦି
idonglo seolchi	ରାତୁଂପ୍ରକିଳି
호기심	କୁଣ୍ଡଳିଲିପିନ୍ଦି
hogism	ବୁଦ୍ଧିଶୈଳି
유발	ପ୍ରକ୍ରିଯାପିନ୍ଦି
yubal	ଫିଲ୍ପେଇଚିନ
물건 치움	ବୁଦ୍ଧିଶୈଳିପିନ୍ଦି
muleeon chium	ବ୍ରିମିପାରାଚି

■ 돼지가 이동시 싫어하는 장소

ဝက်များ မသွားချင်သည့်နေရာ

윔마므똬친띵네이야

→ 내리막길

လမ်းလွှာ

란서

▶ 이동시 소리가 나는 곳(철팽위 등)

ଲଭିତା: କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିମାଣିତ ହେଉଥିଲା

란똬신아딴툇떻네이야(딴빠 아사신뜨ߨ)

▶ 바닥면 상태가 갑자기 바뀌는 곳(바닥에 물이 고이는 등)

မေပြင်၏ အကြေအနေ ရတ်တရက်ဖြောင်းသွားသည့်နေရာ (မေပြင်တွင်ရေအိုင်နေရာင်း အစရိသဖို့)

메뺀잇 아체아네 육뜨양 빠옹뙤떳네이야(메뺀된 얘아옹네이친 아사신뜨핀)

▶ 갑자기 환경이 바뀌는 곳(밝은 곳에서 어두운 곳, 따뜻한 곳에서 추운 곳)

ရုတ်တရဂ်ပလိဝန်းကျင်ပြောင်းသွားသည့်နေရာ(လင်းသောနေရာမှ မောင်သောနေရာ၊ နေးတွေးသောနေရာမှ အေးသောနေရာ)

욕뜨았狎원찐빠뚱네이야(린네이띠네이야마 마옹네이띠 네이야, 뇌퇴띠네이야
마 애이띠네이야)

단어모음	ଡାଙ୍ଗୁରୁଙ୍କୁବୁ ଦାନ୍ତିଲୁହୁ
사까릉마 숙시루	
통로 바닥	ଲେନ୍ଗାରୁଣ୍ଡିଲୁହୁ
tolgo badag	ଲାଞ୍ଜାୟିମେପ୍ରେ
판자	ଷେଟ୍ଟାପ୍ରିଃ
panja	ଫିଟାପ୍ରି
천	ହିଂକି
cheon	ଚୋପା
단계	ଆହୁଂ
dangye	ଆଶି
이동	ଏପ୍ରିଣ୍ଡ଼ିଲୁହୁିଃ
idong	ବ୍ରୋଉଷିଜି

▶ 정면에서 바람이 부는 곳

အရှေ့ဖက်တွင်လေတိုက်သည့်နေရာ
아냈박된 래이딱떴네이야

▶ 미끄러운 곳

ချော်သောနေရာ
처떠네이야

▶ 사람이나 다른 동물이 있는 곳

လူထို့မဟုတ်အမြားတိုင်းတွင်ရှိသောနေရာ
루똑므혹아차뜨랙산신떠네이야

▶ 앞이 막힌 곳

အရှေ့ပိတ်နေသောနေရာ
아셋뻬네이띠 네이야

▶ 옆이나 앞이 갑자기 낮아지는 곳(절벽, 난간부위)

ဘေးသို့မဟုတ် အရှေ့တွင် ရှုတ်တရက်နိမ့်ကျေသွားသောနေရာ(ရွှေတိုက်ကွင်းပါး၊ လျေကား အစရိုသြား)
베똑므혹아세의뛰 육프약 네익짜파떠네이야(차옥까빠, 레이까 아사싯프판)

단어모음 စောင်းများ စွဲတွင်
사까롱먀 숙시목

후보 웅돈 도입후 적응 (5~6개월령)

아안왓동외빠나육 짓따앗이웅뿌록친(으아~차육라짜)
아안왓동외빠나육 짓따앗이웅뿌록친(으아~차육라짜)

도입 및 적응기간

05년 05월: 5~6개월령
외유친닛씩따앗친

■ 도입 후 3~4주간 격리 사육 실시

05년 05월: 3~4 05년 05월: 5~6개월령
외유빠 뚝~레이빠나육된 쇠차빠 아사좌친

▶ 질병 유무 관찰 및 항생제 크리닝, 백신접종 완료

05년 05월: 5~6개월령
여가시드시싯쎄이친닛 뽀니지와쎄이

■ 후보웅돈 내외부 구충

05년 05월: 5~6개월령
아안왓또아뛴아뻗딴차친

▶ 매년 1~2회 이상 구충(봄, 가을 전체실시(연2회))

05년 05월: 1~2 05년 05월: 5~6개월령
닉파잉 뜨~닉째잉아택딴차친(뇌우, 싸옹우 롤사옹친 뜨닛느재인)

■ 돈방 바닥은 미끄럼지 않도록 돈분 제거, 톱밥을 깔아줌

05년 05월: 5~6개월령
왓찬짠뻔드쳐야옹아닉아찌마페사친, 뒷사킨빼이친

■ 후보웅돈 때의 관리에 따라 웅돈의 성격이 결정(거칠게 다루지 말 것)

05년 05월: 5~6개월령
아안왓또 텩畋띤아첸아락 왓뚱잇 아짓고 쟁팟(짠딴炒作가잉찌안)

▶ 난폭한 웅돈은 현황판 기록후 세심한 관리 ▶ 안전사고 예방

05년 05월: 5~6개월령
짠딴띠왓띠아맛타빠 아투사옥샤육얀 배이안드얘핏친마까꾀얀

단어모음 05년 05월: 5~6개월령
사까롱먀 숙사목

후보 웅돈	05년 05월: 5~6개월령 hubo ungdon
관리	05년 05월: 5~6개월령 gwanli
격리	05년 05월: 5~6개월령 gyeogli
사육	05년 05월: 5~6개월령 sayug
구충	05년 05월: 5~6개월령 guchung
바닥	05년 05월: 5~6개월령 badag
돈분 제거	05년 05월: 5~6개월령 donbun jegco
톱밥	05년 05월: 5~6개월령 tobbab
안전사고	05년 05월: 5~6개월령 anjeonsago
예방	05년 05월: 5~6개월령 yebang

웅돈 일반관리

아기에게는 아기에게는 아기에게는
왓또아 뿐만탱땡친

성숙한 웅돈의 일반관리

아래와 같은 원칙을 고려해 주어야 한다:
▶ 물과 영양제를 적절히 섭취하는 것
▶ 충분한 운동과 활동
▶ 충분한 수면과 휴식
▶ 적절한 환경 조건
▶ 적절한 옷차림

■ 사료급여 : 종돈사료 또는 포유돈 사료를 체중에 따라 가감 급여

0.5kg/kg의 원칙을 고려해 주어야 한다:
▶ 물과 영양제를 적절히 섭취하는 것
▶ 충분한 운동과 활동
▶ 충분한 수면과 휴식
▶ 적절한 환경 조건
▶ 적절한 옷차림

왓사죄친 묘락밋와아사 뜻마혹 녹딱밋왓아사고 꼬아레이친아락 죄친

▶ 200kg인 웅돈에는 1일 2.7kg

200kg인 웅돈에는 1일 2.7kg

느야끼로그램식띠 왓또아 뜻아리 브리프마쿠느끼로그램

▶ 250kg인 웅돈에게는 1일 3kg정도를 기준으로 급여

250kg인 웅돈에게는 1일 3kg정도를 기준으로 급여

느야끼로그램식띠 왓또아 뜻아리 브리프마쿠느끼로그램

■ 온도관리 : 웅돈의 적정 사육온도는 18°C(13°C~24°C)

아우성이 18°C(13°C~24°C)로 설정되는 경우:
▶ 10~15°C: 10~15°C
▶ 15~20°C: 15~20°C
▶ 20~25°C: 20~25°C
▶ 25~30°C: 25~30°C

아뿌친탱땡친 띤띠며 왓또모류띤아뿌친마 째잇식 디그리신드리객(섹동~닉섹레이
디그리식디그램)

■ 채광 : 하루 12시간 이상 밝은 빛(최소 300룩스 이상)채광

아울င်းပေါ်ခြင်း: 100% 12시간 이상의 채광은 적당하다.
▶ 100% 12시간 이상의 채광은 적당하다.
▶ 100% 12시간 이상의 채광은 적당하다.
▶ 100% 12시간 이상의 채광은 적당하다.

■ 웅돈 사용후 반드시 웅돈카드에 사용 기록

0.5kg/kg의 원칙을 고려해 주어야 한다:
▶ 물과 영양제를 적절히 섭취하는 것
▶ 충분한 운동과 활동
▶ 충분한 수면과 휴식
▶ 적절한 환경 조건
▶ 적절한 옷차림

왓또야 뚱뚱나우 왓또찬테이듯 팬테이삐 뚱뚱맛딴안

■ 생후 36~40개월령 이상으로 승가상태 불량 웅돈 도태(정액상태 불량, 환돈 등)

▶ 36~40개월령 이상으로 승가상태 불량 웅돈 도태(정액상태 불량, 환돈 등)
▶ 36~40개월령 이상으로 승가상태 불량 웅돈 도태(정액상태 불량, 환돈 등)
▶ 36~40개월령 이상으로 승가상태 불량 웅돈 도태(정액상태 불량, 환돈 등)

뫼쁜 뚱세이차웃~레이세이라 짜빠나우 메이라잇밋아체아네이 므까옹밋왓또아 빼친
(뜻애아체아네이 므까옹밋왓또아 빼친)

■ 모돈 20~30두에 웅돈 1두 비율로 웅돈 보유

0.5kg/kg의 원칙을 고려해 주어야 한다:
▶ 물과 영양제를 적절히 섭취하는 것
▶ 충분한 운동과 활동
▶ 충분한 수면과 휴식
▶ 적절한 환경 조건
▶ 적절한 옷차림

왓마 낙세이~뚱세이까옹된 왓또뜨까옹타친

단어모음 ဝါဘာလုပ်မှု: စုစုပေါင်းမှု
사까롱먀 숙사목

웅돈	ဝက်သိုး
ungdon	왓또
관리	တိန်ထိန်း
gwanli	템行政机关
종돈사료	ပူးဝါယ်ဝါယ်စာ
jongdonsalyo	묘앗와사
체중	ကိုယ်အလေး
chejung	꼬아레이친
가감 급여	gagam geub-veo
	ဇော်ပွဲကျော်ခြင်း
	엿빠죄친

1일	တန်ဂါ
il-il	뜨앗
2.7kg	ijeomchilkillogeulaem
2.7	ကိုယ်ရှစ်
	느따뜨마쿠느끼로그램

3kg	samkilloguelaem
3	ကိုယ်ရှစ်
	뚱끼로그램
	채광
	chaegwang

12시간이상	အလင်းပေါ်ခြင်း
yeoldusigan-isang	
12	နာရီခုခုခု
	쎄이닉나이아텍
	카드
	kadeu

사용 기록	သံသည်မှတ်တမ်း
sayong gilog	뚱밋맛딴
	불량 웅돈
	bullyang ungdon
	ဇော်ပွဲကျော်ခြင်း
	မြားခြား

일상관리

눅.온도.습도.환기
네이신 텅땡친

사료, 음수, 온도, 환기 관리

0원짜리 텅땡친은 원래 텅땡친이 아닙니다. 텅땡친은 원래 텅땡친입니다.

■ 사료관리

0원짜리 텅땡친은 원래 텅땡친입니다.
왓사탱땡친

▶ 오전 7시 사료통 청소 후 사료급여, 그 이후 자동급이기에 사료채우기, 돈분청소

0원짜리 텅땡친은 원래 텅땡친입니다. 텅땡친은 원래 텅땡친입니다. 텅땡친은 원래 텅땡친입니다. 텅땡친은 원래 텅땡친입니다.

만약 쿠느나이 왓사과 땃신뼈나육 왓사찌친, 토나육아로이록아사빼빼된 아사펫친, 왓사팻신친

▶ 오후 4시 사료통 청소 후 사료급여, 그 이후 자동급이기에 사료채우기, 돈분청소

0원짜리 텅땡친은 원래 텅땡친입니다. 텅땡친은 원래 텅땡친입니다. 텅땡친은 원래 텅땡친입니다. 텅땡친은 원래 텅땡친입니다.

만약 레이나이 왓사과 땃신뼈나육 왓사찌친, 토나육아로이록아사빼빼된 아사펫친, 왓사팻신친

■ 임신돈 계절 백신 관리

0원짜리 텅땡친은 원래 텅땡친입니다. 0원짜리 텅땡친은 원래 텅땡친입니다.
꼬운식잇 왓아 야띠아라잇 까꾀쎄이 토친

▶ 계절 백신(일본뇌염백신) : 5~6월경 3~4주 간격으로 2회 이근부 주사

0원짜리 텅땡친은 원래 텅땡친입니다. 0원짜리 텅땡친은 원래 텅땡친입니다. 0원짜리 텅땡친은 원래 텅땡친입니다.

야띠아라육까꾀쎄이(짜빠옹나웃야옹까꾀쎄이) 빠육삐 응아~차육라칸嚇 똥~레이빠 아짜 느째인 나아인빠인嬖쎄이 토친

▶ 구충 : 봄, 가을 전체실시(연2회)

0원짜리 텅땡친은 원래 텅땡친입니다. 0원짜리 텅땡친은 원래 텅땡친입니다. 0원짜리 텅땡친은 원래 텅땡친입니다.

단어모음

0원짜리 텅땡친은 원래 텅땡친입니다.

사까롱먀 숙사목

일상관리 0원짜리 텅땡친은 원래 텅땡친입니다.

ilsang-gwanli 네이신행맹무

사료 0원짜리 텅땡친은 원래 텅땡친입니다.

salyo 왓사

음수 0원짜리 텅땡친은 원래 텅땡친입니다.

eumsu 파웃애

온도 0원짜리 텅땡친은 원래 텅땡친입니다.

ondo 아뿌천

환기 0원짜리 텅땡친은 원래 텅땡친입니다.

hwangi 레이원레이펫

사료통 청소

salvotong cheongso

0원짜리 텅땡친은 원래 텅땡친입니다.

윗사柙肽신친

사료채우기 0원짜리 텅땡친은 원래 텅땡친입니다.

salyochaeugi 왓사펫친

돈분청소

donbuncheongso

0원짜리 텅땡친은 원래 텅땡친입니다.

아닉아제이딱신친

임신 초기

ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရွင်
꼬운아서빠잉

교배~30일까지 BCS : 2.5목표

မိတ်လိုက်ဖြူး ~30ရက်အထိ BCS : 2.5 အထိရည်မှန်း
မောင်လိုက်ပြီး ~30ရက်အထိ BCS : 2.5 အထိရည်မှန်း

■ 입식 전 수세 및 급수시설을 점검

အစာမကျေးခင် ဆေးကြောခိုင်းနှင့် ရေတိက်သည့်ပစ္စည်း စစ်ဆေးခြင်း

아사므로 키친 씨이 찌친 냇 애따잇 빛브시 싯셰친

■ 1차 교배와 동시에 임신초기 관리 시작(모든 현황판 1차 교배일 기록)

ပထမတစ်ကြိမ် ပါတ်လိုက်ခြင်းနှင့်အတူ ဂုဏ်သွေးနှာစိမ္ပါဒ်မှုပါတ်ခြင်း(ဝက်မအကြေအနေမှတ်တမ်းတင်သည့်ဘက်တွင် ပထမအကြိမ် ပါတ်လိုက်သည့်ရှင်းမှတ်တမ်းတင်ခြင်း)

브트마드째인 메잇라잇친늦아두 꼬운아사빠인탱땡무사띤친(왓마아체이아네이마맛
떴띤띤 볼떴뽀嬖마아째이 매잇리아잇떴맏답띤친)

■ 1차 교배 후 아래표와 같이 2차, 3차(선택사항)를 실시

ပထမကြိမ်စိတ်လိုက်ပြီးနောက်ပါလယားကဲ့သို့၊ ခုတိယအကြိမ်၊ တတိယအကြိမ်(ရွှေးချယ်နှင့်) ကိုပြလိုပ်ခြင်း

쁘타마아째인 메잇라잇삐나옹 아욱빠 즈야깟똑 뚜드얏아째잇 따떳야아째인(야왜채나잉)꼬 뾰록친

구 분 ශ්‍රීලංකා 과자친	이 유 යෙනුවායෙන් 아짜옹아잉	교배적기 1안(경산돈) හිංදුග්‍රැන්ඩ් ද්‍රෑ 1(ගත්වාස්මන්ද)	교배적기 2안(미경산돈) හිංදුග්‍රැන්ඩ් ද්‍රෑ 2 (යාමංපූජාවයුතුන්ද)
금요일 වෛළා 파옥짜	1일차 1 රුන්දේප්‍රාරි ශ්‍රාමාව්	수퇘지 승가허용 시작후 24시간 후 1차, 12시간 후 2차, 12시간 후 3차(선택)	
토요일 සෝනු සැනෙ이	2일차 2 රුන්දේප්‍රාරි ශ්‍රාමාව්	0075: හිංදුග්‍රැන්දුවුන්දේප්‍රාරි 24 ප්‍රාමිශ්‍රාමාර්ග පට්ටාවක්දී 12 ප්‍රාමිශ්‍රාමාර්ග ඉතියාගැලීම් 12 ප්‍රාමිශ්‍රාමාර්ග තාටියාගැලීම්(ජ්‍යෙෂ්ඨය්)	수퇘지 승가허용 시작후 12시간 후 1차, 12시간 후 2차, 12시간 후 3차(선택)
일요일 තැන්දේ 파닌그뇌	3일차 3 රුන්දේප්‍රාරි ශ්‍රාමාව්	왓티 메잇라잇친ටුප්පානාව 느세잇레이이나웃 브트마아째인 සේ잇나이나웃 두뜨앗아째인 සේ잇나이나웃 따띠앗아째인 (야외채)	0075: හිංදුග්‍රැන්දුවුන්දේප්‍රාරි 12 ප්‍රාමිශ්‍රාමාර්ග පට්ටාවක්දී 12 ප්‍රාමිශ්‍රාමාර්ග ඉතියාගැලීම් 12 ප්‍රාමිශ්‍රාමාර්ග තාටියාගැලීම්(ජ්‍යෙෂ්ඨය්) 왓티 메잇라잇친ටුප්පානාව සේ잇나이나웃 브트마아째인 සේ잇나이나웃 두뜨앗아째인 සේ잇나이나웃 따띠앗아째인(야외채)
월요일 තැන්දේ 파닝라	4일차 4 රුන්දේප්‍රාරි ශ්‍රාමාව්	수퇘지 승가허용 시작후 12시간 후 1차, 12시간 후 2차, 12시간 후 3차(선택)	
화요일 ඇති 잉가	5일차 5 රුන්දේප්‍රාරි ශ්‍රාමාව්	0075: හිංදුග්‍රැන්දුවුන්දේප්‍රාරි 12 ප්‍රාමිශ්‍රාමාර්ග පට්ටාවක්දී 12 ප්‍රාමිශ්‍රාමාර්ග ඉතියාගැලීම් 12 ප්‍රාමිශ්‍රාමාර්ග තාටියාගැලීම්(ජ්‍යෙෂ්ඨය්) 왓티 메잇라잇친ටුප්පානාව සේ잇나이나웃 브트마아째인 සේ잇나이나웃 두뜨앗아째인 සේ잇나이나웃 따띠앗아째인(야외채)	

단어모음 ဧကားလုံးများ စုစည်းမှု


사까롱먀 숙시묵

임신	ନୀଳାଣ୍ଡି
imsin	ଗୋଣ
초기	ଆମେଲାଣ୍ଡି:
chogi	ଆଶପୈଅ
수세	ହୋଇଲାଣ୍ଡି:
suse	ଶେଇଚେତି
급수시설	ଆପିରିଜନ୍କାର୍ଯ୍ୟାଲ୍ସ୍
gebususiseol	ଆପାଇମେଟ୍ସି
교배직기	ମିଳିଟିନ୍ଡିଫ୍ଯୁ
gyobaejeoggi	ମେଇରାଇଟେନ୍
경산돈	ତାଳିକାର୍ଯ୍ୟାଲ୍ସ୍
gyeongsandon	ମାଟ୍ଟାଫୋଟ୍
미경산돈	ମିଗ୍ୟୋଙ୍ସାଂଦନ
	ମାଟ୍ଟାଫୋଟ୍ରୋଫ୍ଟ୍ୟୁର୍ବିଂ
마끄ମୁଫିଡ଼୍	ମାଟ୍ଟାଫୁଟ୍ରାଇଟ୍

■ 재발 여부를 매일 확인 후 조치

(외음부를 관찰하여 점액이 흐르는 등의 재발 징후 조사)

빤핏친심드싯꼬 네잇신심세이친(묘빠잉가꼬짓슈빼 뜻이롯친 아사신덧 빤핏떳아네
이아타심세이친)



〈웅돈 순회를 통한 발정 및 재발정 체크〉

ဝက်သိုးအပြုအမူမှတဆင့် သတ်ဂျတ်ခြင်းနှင့် သတ်ပြန်လွတ်ခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးခြင်း
왓ဒါအပ္ပါယာမှတဆင့် သတ်ဂျတ်ခြင်းနှင့် သတ်ပြန်လွတ်ခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးခြင်း

■ 18~25일경 초음파 임신진단 실시

(공태 확인 시 종모동을 이용하여 교배적기 판단)

18~25 ရက်ခန့်တွင် အက်ထရာဆောင်းရိုက်ပြီး ကိုယ်ဝန်စဉ်ဆေးခြင်း(ကိုယ်ဝန်မရှိလျှင် မိုးဝက်မကိုအသုသံပြု၍ မိတ်ပိုက်သည့်အခါန်ထဲ့ဖြတ်ခြင်း)

제이식-느제이응아역간뒤 악트라사웅야익빼 고운식세이친(꼬운므시린 묘왓마꼬 아
뚱뿔빼 메잇라잇띠아제이嗦팡진)

■ 태아 착상 시기이므로 절대 악정과 휴식

သားကပ်သည့်အချိန်တွင် အနားယူခြင်းနှင့် ဖြမ်သက်ခြင်းလိုအပ်
ပါကပ်ဖော်လုပ်မှုများ အမြတ်ဆုံးဖြစ်ပါသည်။

■ 사료 급여 전 사료통 청소

ဝက်စာမကျွေးမီ ဝက်စာခွက်သန့်စင်ခြင်း
왓사မြှဒ်မြှမိ 왓사ရှေ့ပဲနှုန်း

단어모음	ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଦୂର୍ଲମ୍ବୁ
사까릉ା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ	ଶାକରୁଣ୍ଗ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ
재발 여부	ପରିଚାରକାରୀଙ୍କ ପାପିଚିନ୍ତିର୍ବିଶ
jaebal yeobu	
확인	ଠିକାଇଲୁଣ୍ଟି
hwag-in	ଶିଳ୍ପୀଇଚିନ
외음부	
oeemumbu	
ଶ୍ଵରାକାରୀଙ୍କୁଠିକାଇଲୁଣ୍ଟି	
묘빠잉 가야ପୋଇନ୍	
관찰	ଅନ୍ତର୍ଭାବରେ
gwanchal	ଫଟ୍ସୁଜି
발정	ଅନ୍ତର୍ଭାବରେ
baljeong	ଫଲ୍ଲିଜି
재발정	ଅନ୍ତର୍ଭାବରେ
jaebaljeong	ଫଲ୍ଲିଜି
체크	ଠିକାଇଲୁଣ୍ଟି
chekeu	ଶିଳ୍ପୀଇଚିନ
초짜파 입신진단	
cho-eumpa imsinjindan	
அர்வாய்வுக்கேட்டின்	ଅର୍ଵாய்வுக்கேட்டିଲୁଣ୍ଟି
அத்ராஸுவுப் போன்றீ	ଅତ୍ରାସுଵுପ் ପୋଣ୍ଟିଲୁଣ୍ଟି
절대안정	ଅନ୍ତର୍ଭାବରେ
jeoldaeanjeong	ନିଯମିତ୍ତିକାରୀଙ୍କିର୍ଣ୍ଣିଲୁଣ୍ଟି
휴식	ଅନ୍ତର୍ଭାବରେ
hyusig	ଅନ୍ତର୍ଭାବରେ
사료통 청소	
salyotong cheongso	
ଅର୍ଵாய்வுକୁ କୁଣ୍ଡିଲୁଣ୍ଟି	
왓사ର୍ପାଇଶିତ୍ର	

■ 이동 및 투쟁 등의 스트레스와 과식은 혈중의 황체호르몬(Progesterone)이 감소되어 착상에 도움이 되지 않음

蹂^로는 황체호르몬(Progesterone)이 감소되는 원인으로, 특히 허리와 엉덩이에 통증을 느끼는 경우에 주로 발생합니다.

복부 통증이나 배胀감은 황체호르몬(Progesterone)이 감소된 결과로 나타나는 증상입니다.

BCS1	BCS2	BCS3	BCS4	BCS5

매우 야원 상태 아룬페인 출판 및 아체아네이	야원 튜브 모양 페인 및 뿐만한	정상 상태 풀만아체아네이	다소 과비 아체아네이	매우 비대한 상태 아체아네이
<p>엉덩이와 등뼈 돌출 등뼈가 아프거나 통증이 있는 경우 민감한 통증이나 통증을 느끼는 경우</p> <p>측면부위 평평 등뼈가 아파거나 통증이 있는 경우 민감한 통증이나 통증을 느끼는 경우</p>	<p>측면부위 평평 등뼈가 아파거나 통증이 있는 경우 민감한 통증이나 통증을 느끼는 경우</p> <p>등뼈가 아파거나 통증이 있는 경우 민감한 통증이나 통증을 느끼는 경우</p>	<p>튜브모양 등뼈가 아파거나 통증이 있는 경우 민감한 통증이나 통증을 느끼는 경우</p> <p>손바닥으로 강하게 눌러야 엉덩이와 등뼈가 느껴짐 등뼈가 아파거나 통증이 있는 경우 민감한 통증이나 통증을 느끼는 경우</p>	<p>엉덩이와 등뼈가 느껴지지 않음 등뼈가 아파거나 통증이 있는 경우 민감한 통증이나 통증을 느끼는 경우</p> <p>전반적으로 불룩한 상태 등뼈가 아파거나 통증이 있는 경우 민감한 통증이나 통증을 느끼는 경우</p>	<p>엉덩이와 등뼈가 지방에 의해해서 심하게 덮여졌음 등뼈가 아파거나 통증이 있는 경우 민감한 통증이나 통증을 느끼는 경우</p>

단어모음 စက္ခားများ စွမ်းပေါ်
사까롱마 숙시목

스트레스 ဆင်ဖို့
seuteuseu ဆောင်ဖို့

과식 အပွဲ့အကျွဲ့ပြုး
gwasig 아통아준사진

분만사 주간관리 세부사항

포유모돈 관리를 주간 단위로 끊어서
요일별로 표준화된 작업

구 분 छोಟ୍ଟିଯିଂ: କୋଜାଚିନ	오 전 ଓଫିଚିନ୍: ମାନେବାଇ	오 후 ଓ.ଲ୍ୟାନ୍ଡିନ୍: ନେଇରେପାଇ
월요일 ଦାନ୍ତା ଫର୍ମିନା	철분주사, 거세 ଘୋରିଯିବେଳେବେ ଦୋଃବଣ୍ଡିନ୍: ଧନ୍ତତୋଶୀ, ଓଇଏଫିଚିନ	철분주사, 거세 ଘୋରିଯିବେଳେବେ ଦୋଃବଣ୍ଡିନ୍: ଧନ୍ତତୋଶୀ, ଓଇଏଫିଚିନ
화요일 ଓର୍ଗି ଇଂଗା	자동사 <u>지워</u> ଠିକିବାପାଇବିବେଳେବେର୍ବେଲ୍ଲିନ୍: ଉଠାପୁଅତାଥୁପୁଅତିଚିନ	카드정리(분만예정돈), 치료 ପ୍ରିନ୍ଟିଙ୍ଗିନ୍:(ଭୋଗିବିବାବିର୍ବିନ୍): ଗ୍ରାହିନ୍: ଛାନ୍ତିଚିନ(ଫିକାନ୍ତାପାଇ)ଗ୍ରାହିନ୍: ପାଇଚିନ
수요일 ଦୁଃଖା ବୁଦ୍ଧିପାଇ	분만처치, 이유준비 ବାହ୍ୟାପିନ୍ଡିଲ୍ଡିନ୍ଫା ଥି.ପୋରିପିନ୍ଡିନ୍: ଫାଫିଚିନ୍ତା, ନ୍ଯୋଯାନ୍ତିଚିନ	분만처치, 양자관리, 이유준비 ବାହ୍ୟାପିନ୍ଡିଲ୍ଡିନ୍ଫା: ଭୋଗିବାବିର୍ବିନ୍: ପାଇଚିନ୍ତିନ୍: ଥି.ପୋରିପିନ୍ଡିଲ୍ଡିନ୍ଫା: ଫାଫିଚିନ୍ତା, ମୋଟାଟିପେନ୍ଚିନ, ନ୍ଯୋଯାନ୍ତିଚିନ
목요일 କ୍ରାବିଲାଇଟ୍ ଜାଫାଲ୍ଟିପେ	이유, 수세 ଥି.ପୋରିପିନ୍ଡିନ୍: ହୋଇପିନ୍ଡିନ୍: ନ୍ଯୋଯାନ୍ତିଚିନ	수세, 치료 ହୋଇକ୍ରାବିଲାଇଟ୍: ଗ୍ରାହିନ୍: ଶୈଅଚିନ, ଗୁପାଇ
금요일 କୋଲ୍ରୋ ଫାଉର୍	유도분만, 백신, 철분주사, 양자관리 ଭୋଗିବାବିର୍ବିନ୍ଫା ହେଲିବିଲିନ୍ଦିନ୍: ଘୋରିଯିବେଳେବେ ଘୋରିଯିବେଲ୍ଲିନ୍: ପାଇଚିନ୍ତାବିର୍ବିନ୍ଫା ପାଇଚିନ୍ତିନ୍: ଫାଫିଅପୁଅତାଥୁପୁଅତିଚିନ, କାପିଶୀଏ, ଧନ୍ତତୋଶୀ, ମୋଟାଟିପେନ୍ଚିନ, ମୋଟାଟିପେନ୍ଚିନ	분만처치, 양자관리 ବାହ୍ୟାପିନ୍ଡିଲ୍ଡିନ୍ଫା: ଭୋଗିବାବିର୍ବିନ୍ଫା: ଫାଫିଅପୁଅତାଥୁପୁଅତିଚିନ, ମୋଟାଟିପେନ୍ଚିନ
토요일 ଦୁଃଖ ସାନ୍ତେଇ	분만예정돈 입식, 이각/거세작업, 양자관리 ଦୋଃବଣ୍ଡିନ୍: ଫାହ୍ୟାପିନ୍ଡିଲ୍ଡିନ୍ଫା ପାଇଚିନ୍ତିନ୍: ଦୋଃବଣ୍ଡିନ୍: ଦୋଃବଣ୍ଡିନ୍: ପାଇଚିନ୍ତିନ୍: ଫିକାନ୍ତାପାଇଚିନ, ନାର୍ଦିବାତାପାଇଚିନ, ଓଇଏଫିଚିନ, ମୋଟାଟିପେନ୍ଚିନ	통합관리(주변정리경돈, 분뇨처리작업) ଘୋରିଯିବେଲେବେ ଘୋରିଯିବେଲ୍ଲିନ୍: (ହୋଇବାବିନ୍ଦିନ୍ଫାଇଲିନ୍ଦିନ୍: ଆପାରାଇଲିନ୍ଦିନ୍ଫାଇଲିନ୍: ବୈବିଧିପାଇଚିନ, ବୈବିଧିପାଇଚିନ, ବୈବିଧିପାଇଚିନ) 수수빠웅ଟେପିନ୍ଚିନ(ବୈବିଧିପାଇଚିନ, ବୈବିଧିପାଇଚିନ, ବୈବିଧିପାଇଚିନ)

일상관리

사료, 음수, 온도, 환기관리

ဝက်စာ၊ သောက်ရေ၊ အပူခိုန်၊ လေဝင်လေထွက်ထိန်းသိမ်းခြင်း
왓사, 따웃애, 아뿌체인, 레이윈레이팃팅땡칭

■ 사료급여시 관리

ဝက်စာကျွေးစဉ်ထိန်းသိမ်းခြင်း

왓사쬐신텡땡칭

▶ 사료급여시 매번 신선한 사료를 먹을 수 있게 남기 사료는 퍼내고

새로운 사료 급여(남기사료 퍼내면서 니플을 눌러 점검)

ဝက်စာကျေးဇူးလုပ်အတွက်သော ဝက်စာတန်ဖိုးရန် ကျဉ်းသည့်အတာကိုထုတ်ပြီး အသစ်ပြန်လည်ထုတ်ပေးခြင်း(ကျဉ်းသည့်အတာကိုထုတ်ပေး မေဂါဒ်ခေါင်းကိုပြီးစစ်ဆေး)၊

왓사쬐신 아매딴라삿며 왓사사나잉얀 짠떳아사꼬 톡뻬 아떴빼래햇뻬이친(짠떳아사꼬토의 애빠이끼온꼬삐뻬신세이)

▶ 분마 후 4일령까지 유방과찰(MMA(무유증) 과찰)

မွေးပြီး နောက် ငရ်က်အထိ နဲ့ စစ်ဆေးခဲ့ (MMA(နဲ့ မထုက်သည့်ရောဂါ) စစ်ဆေးခဲ့)

뫼뻬나울레이양아투 놀실세이양(엠엠에이(놀무탉띠여가)실세치)

▶ 유증보비 딱딱한 유방 유방주위의 푸르 박점 및 유두 상처 관찰

နိုင်ရည်ထွက်ခြင်း၊ မာသောရင်သား၊ ရင်သားဘေးတစိက်တွင် အပြောရောင် အကွက်နှင့် နိုင်သိခေါင်းအနာ

놀이탈친, 마더잇따, 잇따베이뜨왈뛰 아빠야옹 아찔닛 놀띠까옹아나

▶ 수유거부 모든 및 질의 탁한 다갈색 분비물 관찰

녹으딱로 떻왕마넋잉가장뛰 아뇨야옹 아얘톡친싱으싱찌슈침

단어모음 စကားလုံးများ စွမည်မျှ

사료	စာရွှေ
salyo	သုတေသန
음수	သောက်ရေ
eumsu	ပါးခွဲ
환기	လေဝင်လေထွက်
hwangi	ရော်သော်
새로운 사료	ဂျောက်ဆိပ်
sacloun	geub-yeo
아동용화장품	အကျဉ်းသယ်ပြုများ
아시아마켓텔레이	အာရားအမြတ်
유방관찰	သုတေသန
yubang-gwanchal	သုတေသန
원단화장품	အကျဉ်းသယ်ပြုများ
인피시제이친	အာရားအမြတ်
분비물관찰	သုတေသန
bunbimulgwanchal	သုတေသန
아동용화장품	အကျဉ်းသယ်ပြုများ
아이탈취실물신싱세이	အာရားအမြတ်

분만대기

입식 1주전 관리

ခြုံမသွင်းမိ သပတ်အလိုတွင် ထိန်းသိမ်းခြင်း
찬မြတ်မီ ဤပါးအရာ ဖြစ်ပါသည်။

■ 1분간 니플을 눌러 물을 받은 후 페트병 등을 이용해 그 양을 재어봄

တစ်မိန့်ခန့်၊ ရွှေဂုံးခေါင်းကုန်ပြီး ရေချို့ဖြောက် ပလတ်စတင်ပူလင်း အစရိဘုည်ကို သုံး၍
ပမာဏကိုပိုင်းတာခြင်း

뜨미닛칸 애빠까옹꼬 넥삐애칸삐나욱 뺄락스틱브린아스신띠꼬 똥삐 빠마나꼬 땅따친

→ 급수기(니플)는 최소 분당 2ℓ 가 나와야 정상

ရော်က်ခေါင်းတွင် အနည်းဆုံး မိနစ်တိုင်း ၃၁ ထွက်မှ ပုံမှန်ဖြစ်ခြင်း
အောင်အွာမြတ် အနေဖြင့် မိနစ်တိုင်း ၃၁ ထွက်မှ ပုံမှန်ဖြစ်ခြင်း

▶ 급수는 사료섭취량 및 젖생산량에 직접적인 영향을 미치므로 항상 점검

ရေပေါင်းသည် အတာကျွေနှစ်းနှင့် နိုတ်ကြန်းနှင့် တိုက်ရှိက်ဆက်ပဲမျှရှိသဖြင့် အစဉ် စစ်ဆေးနိုင်
ယောက်ပါ အသံချွေနှုန်းနှင့် လုပ်ဆောင်ရေးနှင့် ပြည်တော်လုပ်ငန်းနှင့် အတူအညီ

■ 분만 약 1주일 전에 분만사에 입식(분만일자 순으로 정렬)

သားမဏ္ဍားမဲ့ တစ်ပတ်အလိုတွင် သားဇားခံသိပို့ခြင်း(သားဇားမည်ရက်အလိုက်ဖို့ခြင်း)

따므꽈미 뜨빡아로뒤 따꽈찬똥뽀징(따꽈밋양사락시친)

■ **부만 준비**

သားဖားရန်ပြင်ဆင်ချင်း

따파야빠신칭

▶ 충분한 깔끔 및 신문지 준비, 급수기, 보온등 작동 여부 확인

လုပ်လောက်သော ကောက်ရှိနှင့် သတ်င်းစံပြင်ဆင်ခြင်း၊ ရွှေစိတ်ခေါင်း၊ အပူပေးးး၊ အလုပ်လုပ်မလုပ်စိုဆေးရန်

롱락떠 까亢요닉 뜨띵사뻬씨친 애빠익까웅, 아뽀뻬이미 아록록므로 싯세이야

▶ 갓돈 몸을 닦아줄 수건, 니퍼 날 무딘지 확인 및 소독, 탱줄을 묶기 위한 실 및 갓온도 준비

မွေးဒါနအကောင်းကို လိုလိုရှိ သုတေသနပည့် ပါ၏ ညျှမှု ချို့ထင်ရှုစွဲများ ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိခဲ့ပါ။

뫼카시아까웅잇 꼬꼬 뜻빼이잇 뻔와 낫 춘탁칭 시므싯싯세친닉 뾰딱친 찻쪼치얀 앗
치쭈닝아이오더쎄이애뻬시

▶ 분만을 위한 올시토신, 해열제, 대사촉진제 등 약품을 준비

단어모음	영어	한국어
사카루마속시목	Sacculum succulentum	사카루마속시목
분만대기	bunmandaeji	분만대기
1분간	ilbungan	1분간
니풀	nipeul	니풀
양	yang	양
재어봄	jaceobom	재어봄
급수	geubsu	급수
점검	jeomegeom	점검
1주일	ilju-il	1주일
분만사	bunmansa	분만사
입식	ibsig	입식
분만준비	bunmanjunbi	분만준비
깔짚	kkaljip	깔짚
신문지	simmunji	신문지
급수	geubsu	급수
보온	boon	보온
확인	hwag-in	확인
수건	sugeon	수건
니퍼	nipeo	니퍼
실	sil	실
강옥도	gang-ogdo	강옥도
옥시토신	ogsitosin	옥시토신
해열제	haeyleolje	해열제
대사촉진제	daesachoginje	대사촉진제
제이피로드	jeipurod	제이피로드
지와펫신도파티미세이	jiwabettinodopatimisei	지와펫신도파티미세이
약품	yeokpum	약품

■ 분만 전후에 젖꼭지 끝부분의 이물질을 제거

부드러운 손으로 젖꼭지를 살피면서 젖꼭지 끝부분에 허약한 자손을 제거하는 방법입니다.

모래처럼 빠져나온 젖꼭지 끝부분은 젖꼭지 끝부분을 제거하는 방법입니다.



〈유방 마사지〉

젖꼭지 끝부분을 살피고
제거하는 방법입니다.

■ 손으로 문질러 유즙을 조금씩 찌꺼기로 제거

손으로 문질러 유즙을 조금씩 찌꺼기로 제거합니다.

락핏 낚시 농기구를 사용합니다.

■ 먼저 난 새끼는 양수제거 등 적절한 분만자돈 조치 후 충분히 포유시켜 보온 상자에서 체력이 회복될 수 있도록 조치

제거한 새끼는 체온을 유지하기 위해 적절한 조치를 취합니다. 새끼는 체온을 유지하기 위해 적절한 조치를 취합니다.

제거한 새끼는 체온을 유지하기 위해 적절한 조치를 취합니다. 새끼는 체온을 유지하기 위해 적절한 조치를 취합니다.

■ 체중이 작은 자돈을 앞쪽 유두에서 포유할 수 있게 조치

제거한 새끼는 체온을 유지하기 위해 적절한 조치를 취합니다. 새끼는 체온을 유지하기 위해 적절한 조치를 취합니다.

제거한 새끼는 체온을 유지하기 위해 적절한 조치를 취합니다. 새끼는 체온을 유지하기 위해 적절한 조치를 취합니다.

▶ 분만 후 며칠동안이라도 포유시 우량 자돈을 잠시 보온상자에 가두어 허약 자돈이 앞쪽 유두를 차지할 수 있도록 조치

제거한 새끼는 체온을 유지하기 위해 적절한 조치를 취합니다. 새끼는 체온을 유지하기 위해 적절한 조치를 취합니다.

제거한 새끼는 체온을 유지하기 위해 적절한 조치를 취합니다. 새끼는 체온을 유지하기 위해 적절한 조치를 취합니다.

제거한 새끼는 체온을 유지하기 위해 적절한 조치를 취합니다. 새끼는 체온을 유지하기 위해 적절한 조치를 취합니다.



〈분할 포유〉

제거한 새끼는 체온을 유지하기 위해 적절한 조치를 취합니다. 새끼는 체온을 유지하기 위해 적절한 조치를 취합니다.



〈허약자돈 포유 유도(1번유두)〉

제거한 새끼는 체온을 유지하기 위해 적절한 조치를 취합니다. 새끼는 체온을 유지하기 위해 적절한 조치를 취합니다.

단어모음

여기서는 몇 가지 단어를 소개합니다.

사까롱마 숙시목

젖꼭지	젖꼭지
jeokkkogji	젖꼭지
이물질	이물질
imuljil	이물질
제거	제거
jego	제거
유방 마사지	유방 마사지
yubang masaji	유방 마사지
유즙	유즙
yujeub	유즙
짜줌	짜줌
jjajum	짜줌
충분히	충분히
chungbunhi	충분히
포유	포유
poyu	포유
보온 상자	보온 상자
boon sangja	보온 상자
작은 자돈	작은 자돈
jag-eun jadon	작은 자돈
앞쪽	앞쪽
apjjog	앞쪽
우량 자돈	우량 자돈
ulyang jadon	우량 자돈
분할 포유	분할 포유
bunhal poyu	분할 포유
허약자돈	허약자돈
heoyagajadon	허약자돈

■ 자돈은 분만 후 3일 이내에 자신이 포유하는 유두가 결정됨

သားပေါက်သည့်မွေးပြီး သုံးရက်အတွင်း စိုးသည့်နဲ့ သီးခေါင်းသတ်မှတ်ပြီးချင်း

따빠욱따 뫼뻬 똥얏아뛴 속떳녹띠가웅따맛뻬칭

■ 통상적으로 모든 앞쪽의 유두가 비유량이 많고 한번 정해진 유두는 이유시까지 고정됨

ပုံမှန်အားပြင် ဝက်မ၏ အရေဖက် နဲ့သီခေါင်၏ နဲ့တွက်နှစ်ဦးများပြီး တစ်ခါ သတ်မှတ်ပြီးလျှင် နဲ့သီခေါင်သည် နဲ့ဖြတ်သည်အထိ ပုံသဏ္ဌာန်ပေး

쁜만아핀
왓마잇아세팟 녹띠강잇 녹툭농마俾 뜨카딱막俾린 녹띠가옹띠 녹페띠아티
뽀떼이피չ



머리쪽(자돈이 크다)
ମ୍ରିଃଫେରିଙ୍ଗେର୍ (ହାଃପେରିଙ୍ଗୁଣ୍ଟିଃ)
우가웅펙(따빠울찌)

꼬리쪽(자돈이 작다)
အမြို့ဖော်(သားပေါက်ထဲ)
아모펙(띠뼈육아)

〈자돈의 유두 결정〉

■ 난산대비

မွေးရခက်ခြင်းအတွက်ပြင်ဆင်ခြင်း

뫼야각칭아떡뺀신칭

▶ 생식기에 핏물, 체온상승, 사료섭취 거부 및 예정일 2일 이상 경과한 모돈은 일단 의심축으로 기준하고 유심히 관찰

မျိုးများအကိုတွင်သွေးပေါင်း၊ အပူရဲနိတက်ခြင်း၊ အလာမဟားခြင်းနှင့် မွေးမည့်ရက် နှစ်ရက်အလိုက်ပျော်ဝါယာ၊ စီးပွားရေသိတို့၏ ပို ၅၂ ကြော်၍

묘빠임가뛴 띠빼칭, 아뿌챈딱칭, 아사므사칭닛 묘밋얏 느얏아로찌린 왓마아 송애야
띵왓자또 뿐째 찌슈

단어모음 օօկա: ձվա: գունդա:
사까롱먀 숙시묵

유두	ູດຸ: <i>yudu</i>
결정	ໝ່າງຕົກຕົວ <i>gyeoljeong</i>
관찰	ຕະຫຼາດ <i>gwanchal</i>

▶ 모든 의상에 상처가 나지 않도록 자궁경관의 수축 리듬에 맞추어 손을 서서히 삽입(20cm 정도)

ဝင်မှတ်ဖွေလေးကြောင်းတွင်အနာဂတ်မရအောင် သားအိမ်လမ်းကြောင်းကျဉ်းသည့်အပိန်နှင့်ကိုကြုံ
ည့်ပြန်ချင်းသည်၏၏(20စင်တိမီတာခန့်)。

왓마�뫼란짜옹뛰아나므신아옹 따앤란짜옹찐떳아첸넉까이윗 락고 폐폐친 텍얀(느
쎄이신디미다칸)

▶ 골반에 걸려 있는 1마리 또는 여러 마리의 자돈을 부드럽게 모돈의 진통에 맞춰 끼냄

တစ်ပေါ်ရှိနိုင်ခွဲသော တစ်ကောင် သို့မဟုတ် အကောင်များကို ညွှန်သာစွာဖြင့် ဝက်မမ၏ ညွှန်သည့်အချိန်နှင့် ဂိုဏ်ချိန်ထိပ်ပိုင်း

띈쁘쏜요뛴신떠 뜨까웅또므혹 아까웅먀꼬 닌따솨핀왓마잇 낫떳아체인늬끼익윗 톱칭

▶ 다시 손을 넣어 산도 및 골반에 자돈이 걸려 있지 않음을 확인


ထပ်မြေး လက်ထည့်၍ မွေးလမ်းကြောင်းနှင့် တင်ပဆံရီးတွင် သားပေါက်ရှိမရှိ စစ်ဆေး

탁삐락텍잇 뒷란짜운닛띤쁘쏜요뛴 따빠욱시므시 싯세이

▶ 자돈이 걸려 있지 않으면 분만촉진제(옥시토신, 몬잘 등)를 주사
(자돈이 산도에 걸려 있을 경우 모든 폐사 가능성 있음)

သားပေါက်လရှိဂျုပ် သားဖွားနှင့်လျှို့ဝှက်သည်အေး (oxytocin, Monzal)ကို ထိုးပေါ်ခြင်း (သားပေါက်များသည် ဖွေးလမ်းကြောင်းတွင်မြှုပ်ပါ၏ပိုင်ခြင်ကို သယော်စိုင်ခြေခံရသည်)

따빠-욱-므시-린 따-꽈-얀-로-찌-빼-이-띤-세-이(옥-시-토-신, 몬-잘)꼬 토-빼-이-친, (따-빠-욱-야-띠-뫼-란-짜-웅-뛴-시-린 미-킨-왓-마-떼-이-송-나-이-체-시-디)



〈난산 응급조치〉

단어모음 စကားလုပ်များ စွာည်းမှု
사까롱먀 숙시묵

자궁경관

jagung-gyeong-gwan

သားအိမ်လမ်းကြား

파앤란짜옹

손 ၈၅

son 락

삽입
sab-ib

တင်ပဆုံရိုး

golban 띤쁘쓰요

자돈 ვაჲპერ
자돈 ვაჲპერ

jardon

꺼냄
korean.com

KRCOACHING

■ 기타 조치사항

အခြားလုပ်ငန်း

아차롱앙

→ 모든이 눕지 않을 경우 :

가까이 가지 말고 조용하고 어두운 환경을 만들어 줌

ဝက်မ မလဲနေလျှင် ॥ အနီးကိုမသွားဘဲ တိတ်ဆိတ်စွာ မှာ်အောင်လုပ်ပေး

왓마드레네이린 아니꼬므똬베이 땃쎄잇솨 마옹아옹록뻬이

▶ 식자 발생시 : 자돈이 모든 가까이 못 가게 격리하고 모든에게 진정제(스트레스닐)나 옥시토신을 주사

▶ 분만예정일 보다 3일 정도 지남 :

교배일자를 재점검. 모돈의 복부, 유두 상태 등을 점검 후 분만 유도제 주사 (자돈이 모두 죽어 사산 또는 미이라 상태일 가능성 있음)

မွေးမည့်ရက်ထက် သုံးရက်ကျော်လျှင်၊ ပိတ်လိုက်သည့်ရက်ကိုပြုစစ်ဆေး၊ ဝက်မတိုင်၊ နှိုးသီးခါးအားခြေခြားနေ အာရုံသည်၏ စဉ်ပြီးနောက် မွေးရန် လျှော်ပေးသည့်ဆေးတိုး(သားပေါက်များအား လုံး အသေမြေပိုင်း သို့ မဟာတ် အခြားပေါက်မြေပိုင်းဖြစ်နိုင်)

뫼밋양탁 똥얏찌린 메잇락떴얏꼬 팬싯세이 왓마잇바잇 녹띠까옹아체이아네이 아사
신디고 신뼈나욱 뫼얀 록써빼이밋 췌토(따바욱먀아롱 아페이뫼친 또므흑 아차욱뫼칭
핀나잉)

분만 후 관리

မွေးပြီးနောက်ထိန်းသိမ်းခြင်း

뫼비나욱 텅땡칭

태반이 완전히 배출된 후 관리

ခက်ကြီးကိုဖြတ်ပြီးနောက်တောင့်ရောက်ချင်း

쳇쪼꼬팻삐나욱사욱샤욱칭

■ 부만과정 중 오염된 질내부 세척 (질세척)

မြေးသည်အခိုန်တ် သုစ္စပေသည် အဂိုဇုတ်အတ်းပိုင်းဆေးကြာခြင်း (အဂိုဇုတ်ဆေးကြာခြင်း)

뫼띠아체뒤 낙빼이띠 잉가장아둬빠-웅세이찌치(잉가장세이찌치)

▶ 베타딘 용액이나 생리식염수에 페니실린(또는 스트렙토마이신)을 혼합하여
직내부를 세척

Betadine သို့မဟုတ် ဆားရည်တွင် penicillin(streptomycin) ပြောငြီး အကျင်းမှတ်အတွင်းပိုးဆေးကြော်
べタディ 또 모호한 싸이렌 페니실린(스트렙토마이신) 연폐 이가자아肺肺炎이세이찌

▶ 나사처리를 한 모도 또는 4시가이상 자시가 부마한 모도^으 한생제 조사

မွေးရခက်ခြင်းအတွက် တောင့်ရှောက်မှုပြီးသည့်ဝက်မ၊ လေးနာရီအထက် အချိန်ကြာမွေးသည့်ဝက်မအား ကာကယ်ဆေးထံးပေး

뫼야각칭아될 사울샤울무뻬떴왕마 레이나이태 아체이자뫼;left 왕마아 까꾀쎄이토

단어모음	ଓକ୍ଟୋବ୍ରିଆ: ଫୂଦାମ୍ପୁ:
사까릉마	ସୁଶ୍ରୀମୁ
분만	ଫୁଣ୍ଟିନ୍:
bunman	ମେଚି
후	ହୋଗ୍
hu	ନାୟ
관리	ତୀଳୁହାଲିନ୍ଦିନ୍:
gwanli	ଟଙ୍ଗ୍ପିଚି
태반	ତେବନ
taeban	ଆଜିନ
배출	ବ୍ରାନ୍ଟିବ୍ୟୁ:
baechul	ଚେଟିକ୍ଷା
질세척	ଅନିଲ୍ଲାହୋଲିନ୍ଦିନ୍:
jilsecheog	ଇଂଗାଜାଶୈଯିଛିଚି
항생제 주사	ହଙ୍ଗସେନ୍ଜି ଇସା
hangaengje jusaa	ଗାଗୁଲ୍ଲାହୋଲିନ୍ଦିନ୍:
까페ସେଇଟୋଚି	

■ 난산 응급처치한 모돈이나, 농장내 모돈의 자궁농증상이 전반적으로 심할 경우, 여름철이나 농중상이 심한 모돈의 경우 극히 제한적으로 자궁세척 실시(선택사항)

▶ 분만후 2일째에 생리식염수 500ml당 페니실린 1병 비율로 혼합하여 정액 주입기를 이용하여 자궁내 1,000ml 정도 주입

ჭურးჭოက် နှစ်ရက်အတွင်း သော်လည် 500ml ထွင် penicillin တစ်ပုလင်း အချို့ဖြင့် ရော်းသားအိမ်အတွင်း သို့ သေးတို့အပ်ပြည့် 1,000ml ထိုးပေးခြင်း

뫼뻬나욱 느얏마웃네이뛴 싸애 응아야미리된 페니실린 끄프린 아초핀 여뻬 따앤아뛴 똑 세토앗핀 뜨타옹미리토뻬이친

★자궁세척은 부작용의 우려가 있어 극히 제한적으로 사용되는 방법임

သားအိမ်တေးခြင်းသည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိသဖြင့် အရေးပေါ်အခိန်တွင်ဘာသုံးသည့်နည်းဖြစ်သည်

뜨앤쎄이친띠 배이툭소쪼싯뜨핏 아야빠아체인뛴따뚱띤니핏띠



■ 사료급여관리

အစာကျွေးခြင်း

아싸찐치

▶ **분만당일은 절식**

မေးသည်ရက်တွင် အစာဖြတ်ခြင်း

뫼띠양띠 아사파치

단어모음	ଓଡ଼ିଆ: ଅନ୍ତର୍ଭାବରେ ଦେଖିଲୁଛାମୁଁ
사카룽마	ଶକ୍ରାଂଗିମାରୁ
자궁농	ଜାଗୁନ୍ଗୁନ୍ଗ
jagungnong	ପାଣ୍ପେନ୍ତା
여름철	ଯୋଲୁମ୍ଚୋଳ
yeoleumcheol	ନୋଯାଟି
증상	ଜେଂସଙ୍
jeungsang	ଲାକ୍କନା
사료급여	ଶାଲୋଗେବୁନ୍ଦି:
salyogeub-yeo	ଆଶାକ୍ଷିତି
질식	ଜୋଲିଶିଙ୍ଗ
jeolisig	ଏଶାପ୍ଟିଚିଂ
사료통	ଶାଲୋଗିନ୍
salyotong	ଆଶାକ୍ଷି
물을채워줌	ମୁଲୁ-ଇଉଲ୍ଲାହେବୁଜମ୍
mul-eul chaewojum	ବୈପ୍ରିଣ୍ଟିବୁଣ୍ଡିଙ୍
애피ଲେଇଚିନ	ଏଫ୍ପେଲୀଇଚିନ

포유중 모돈관리

포유중 사료 및 사양관리 이유시 모돈 체평점(BCS) 2.5 목표

녹파익천된아사닛아떼이세잇텅땡예 로앗뻬 녹쾨린 아
롱칸나꼬아체이아네이아맛뻬이칭(BCS) 닉따드마 얘만

■ 분만당일은 절식 또는 소량 급여하고 분만 다음날부터 1kg 급여하여 5일 동안 1일에 1kg씩 증량 급여

မွေးသည့်ရက်တွင် အစာဖြတ်ခြင်း၊ အနည်းငယ်ကျေးပြီး မွေးသည့်နောက်နေ့မှစ၍ 1 ကိုလိုကုမ်ကျေးပြီး ပါးရက်အတွင်း တစ်ရက်လျှင် 1 ကိုလိုကုမ်ပိတ်ပြီးပေးကျေးနိုင်

뫼밋았둬이사펫친, 아네애쬐빼 뫼밋낙네이마사윗 뜨끼로그램쬐빼 응아앗아뛴 뜨얏
린 뜨끼로그램씨또 빼찌양

■ 분만후 5~7일까지 서서히 증량 급여하여 최대 사료섭취량(~/일)에 도달시키고 그 이후 이유식까지 무제한 급여

မွေးပြီးနောက် 5~7 ရက်အတွက် ဖြည့်ဖြည့်စိတ်ပို့တဲ့ပြီး အသားဆုံးဘားသည့်နှစ်ဦး (~/ရက်) ရောက်အောင်လုပ်ပြီး ထို့နောက် နဲ့ ချေသာ်အတွက် အကောင် အသတ်မပေါ်ကော်ရန်

뫼삐나우 응아~쿠느앗아티 폐폐시 또삐 아마쏭사땃농(~/얨야웃아옹록삐 토나웃 녹 쿄띠아티 아까아땀무식찌약

▶ 분만 후 사료급여 방법

မွေးပြီးနောက် အတေကျုံးသည့်နည်း
뫼뻬나ဥ္ၢဥ၊ 아사쬐မိုး

단어모음 စကားလုံးများ စွဲည်ဗုံး 사까롱먀 숙시묵

절식 **jeolsig** အတ္ထဖိတ်ခြင်း
아사팟침

အနော်းငယ်

solyang 아네 얘

급여
geub-yeo

증량

Jeunglyang 죠리너
日刑한

무제한 mujehan 아깐아딱드시

사료섭취량을 늘리는 방법

019-000-0000 0000-0000
왓사사뜬뜨쁘마나 또뜨니

- ▶ 섭취량이 많아지도록 여러 번 나누어 급여
(시원한 야간 균무시 1회 추가 급여)

00-000-0000 0000-0000
왓사사뜬뜨쁘마나마라아옹 아째챈코위 죄친(냐싸잉씬린 뜨챈또위 죄친)

- 여러 번에 나누어 사료급여시 자돈의 암사도 함께 증가하므로
분만 5일 후부터 적용

00-000-0000 0000-0000
아(jButton)(jButton) 00-000-0000 0000-0000
아챈챈코위 아사찌야뛴 따빠욱마 피삐 때나잉뜨팟 되삐 응아앗마사 뛰록칭

- 여름철에는 시원한 아침이나 밤 시간에 먹을 수 있게 함

00-000-0000 0000-0000
뇌야띠뛴 애먀띠 므냑핏핏 냐뛴 사아웅록칭

- ▶ 사료를 남길 경우 사료급여량을 줄인 후 다시 서서히 증량함

00-000-0000 0000-0000
왓사짠린쪼뜨쁘마나꼬 셋차뻬 뺨또뻬이칭
▶ 물과 혼합하여 주면 사료섭취량 10~15% 향상(주의 부폐되기 쉬움)
00-000-0000 0000-0000
애닝여뻬이린 아사사뚱농 드세이~세이옹아 야카이농 또친(뿌리趺아뗏뜨띠타안)

단어모음 000-000-0000 0000-0000
사까롱먀 숙시목

나누어	00-000-0000 0000-0000
nanueo	코뻬이칭
급여	00-000-0000 0000-0000
geub-yeo	죄징

▶ 포유모돈 도태판단

သားပေါက်သည့်ဝင်မ ပယ်မပယ်ဆုံးဖြတ်
တဲ့ပဲထဲမဲ့ အမျှမျှ ပဲပဲ

단어모음 စကားလုံးများ စွဲည်းမှု 사까롱먀 숙시묵

ပယ်သည်
များ

08

이유모돈(종부대기돈) 관리

။ နိုဘယ္တိဝင်ကဗိုး (သားတင်ရှိ စောင့်နေသည့် ဝက်) ထိန်းသိမ်းချင်း
စံ ဤအမြတ်မြတ် ပါမဲ့ အမြတ်မြတ် ဖြစ်ပါတယ်။

이유모돈(종부대기돈) 주간 관리

နှစ်ခုခွဲသည်ဝက်မ(သားတင်ရန်တော်နေသည့်ဝက်)
အပတ်စဉ်ထိန်းသိမ်းခြင်း
녹코ပါးခွဲ(ပါးခွဲထားခွဲနေသူ)အပဲနံပါးခွဲ

이유모돈(종부대기돈)의 주간 관리 및 사료관리

❖ 속여야 헌터인가 (와우: 탐험가 헌터) 헌터는 왜 헌터인가
❖ 아빠시 템데무니 아사텐데무
❖ 녹코핏완마(따띤양사웃네이핏완)이

구 분 .clearRect:; 코자진	오 전 옅은색 마넥빠인	오 후 옅은색 네이아빠인
월요일 타파라 파닝라	발정체크 닠타령구이트리트먼트 똑록친시므시식세이칭	분뇨처리작업, 발경체크, 종부 아연之城:와 흰색 편도체 닠타령구이트리트먼트 아니아제파시从根本: 똑록친시므시식세이칭, 파띤칭
화요일 안기 잉가	종부 와:타령트리트먼트: 파띤칭	종부 와:타령트리트먼트: 파띤칭
수요일 복파후	종부 와:타령트리트먼트: 파띤칭	종부 와:타령트리트먼트: 파띤칭
목요일 짜파쁘떼	종부, 이유모든 전입 와:타령트리트먼트: 흰색 편도체 파띤칭	
금요일 파욱짜	모든 백신접종, 임신진단 인기탈아:타령구이트리트먼트: 흰색 편도체 왓마까페세이토친, 꼬운심모식식세이친	모든스톨정리, 도태모든 판단 인기탈아:타령구이트리트먼트: 흰색 편도체 왓마찬따신친, 빼밋왓마아송따친
토요일 싸네이	사료량 조절, 분만예정둔 전출 인기탈아:타령구이트리트먼트: 흰색 편도체 왓사브마나탱땡칭, 꾀밋왓특징	임신사 수세, 웅돈포피소독 인기탈아:타령구이트리트먼트: 흰색 편도체 왓운시从根本: 왓동인가잇아펜구로 뿐다친

단어모음 စကားလုံးများ စွဲည်းမှု 사까롱먀 숙시묵

사까롱야 숙시묵

이유
iyu

발정체크
baljeongchekeu
ឧបព័ណិតស្នើសុំរាយការណែនាំស្នើសុំ
 똑록친시Miami시싱레이치

분뇨처리
bunnyocheoli
အညစ်အကြေးသန့်ရှင်းခြင်း
아نية제이딱신칫

종부	ဘုရာဓိပြိုင်း
jongbu	파면청
전입	သွန်ပြိုင်း
jeon-ib	.swt
임신진단	ကိုယ်အစိတ်သောပြိုင်း
imsinjindan	꼬운산딱ting
스톨정리	မြှော်နှော်ပြိုင်း
seutolleonggli	잔막신칭
도태모돈	ဟပ်ဆုံးတို့ ပဲမီටာ
dotaemodon	
사료	ဝါရ်ဘ
salyo	왓사
조절	ထိုးထိုးပြိုင်း
jojeol	ဏံုံးချင်
전출	ထုတ်ပြုင်း
jeonchul	툭칭
수세	ဆော်ကြပြုင်း
suse	ဆော်ကြပါ
포피소독	ဒရိုဂ္ဂနှုန်းဆိုတော်
popisodog	이기ဘာပေါက်ရပါတယ်

■ 이유는 목요일 아침 일찍 또는 저녁에 실시

နိုင်ခြင်းအား ကြေသပတေးနေ့၊ မနက တောင် သို့မဟုတ် ညနေပိုင်းတွင်လည်ခြင်း
녹코칭아 짜파쁘레이네이 므냑서서 또므혹 냐네이빠인蓐록칭

■ 이유당일은 절식 또는 소량 급여

နို့ခြားလျှော်နေ့တွင် အဟမြတ်ခြင်းသို့ မဟုတ် အနည်းငယ်ကျေးခြင်း
녹ကြဖ်နောက် အဆာမြတ်ပေါ် အသာဆုံး အမြတ်ဆုံး အမြတ်ဆုံး

■ 이유후 종부시까지 포유돈 사료를 무제한 급여

**နိုဝင်းမြောက် သားတင်သည့်အထိ အစာကို အကန်နဲ့အသက်မရှိ ကျေးခြင်း
녹ကျော်နှင့် ပတ်ပါးမှု ဖြစ်ပါသည်။**

■ 이유모돈 도태판단

ଫିଲେବାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରିମାଣଯତ୍ତା

원인	설명
<p>이유후 무발정</p> <p>季後無發正 季後無發正 녹코빼나옥 뜻므록친</p>	<p>이유 후 14일이 지나도 발정을 보이지 않음 季後十四日不發正 14 日後無發正 녹코빼나옥 새잇레이잇짜띠레이 뜻므록친</p>
<p>공태 무발정</p> <p>妊娠無發正 妊娠無發正 꼬운므시잇 뜻므록친</p>	<p>발정유도제를 2회이상 투여하여도 반응이 없음 發正導引藥二回以上投與而無反應 랜썩록쎄띤쎄꼬 느카아텍찌띠래 뜻빤무므신칭</p> <p>이유 후 3개월 이상 경과하여 공태로 판명된 개체, 3회 이상 재교배가 들어가도 <u>수태가 되지 않는 경우</u> 季後三月以上經過而被認爲妊娠者即使三回以上交配也無法受孕 여전히 임신하지 못하는 경우 여전히 임신하지 못하는 경우 녹코빼나옥 뚨라아티찌띠레이 꼬운므신칭 뚱챈아탁맥빤락띠래 꼬운므신칭</p>

절식
jeolsig

소량 급여

solyang geub-yeo
အနည်းငယ်ကျွေးမြင်း
아네잉애죄칭

무제한 급여
mujehan geub-yeo
အကောင်းအသတ်မရှိဘေး။၏။
아까아딱므시죄칭

도태판단 dotaepandan սյանընկող գիշտա՞լտի ընդ: 빼밋աց գուշակ

무발정 린팅
mubaljeong 랜셋므시칭

발성유노세
baljeong-yudoje
领导干部的领导力
랜섹록써밋씨

수태 sutae

되지 않는 မဖြစ်သော
doeji anhneun 므핏떼

이유모돈(종부대기돈) 발정 관찰

နိုင်ခြားလုပ်ကိစ္စ(သားတင်ရှုတော်နေသည့်ကိစ္စ)
သုတေသနတွင်မျိုးမရှိဘူယ်ရှုခြင်း
녹ကြဖါမှု(ပတ်ဝန်ဆောင်ရေးနှင့်)
ပွဲမြေသာမီမှု(ပတ်ဝန်ဆောင်ရေးနှင့်)
ပွဲမြေသာမီမှု(ပတ်ဝန်ဆောင်ရေးနှင့်)

발정관찰 및 교배적기 판단

သုတေသနတဲ့ ခြင်းရှိမရှိကျဉ်းချုပ်နှင့်
ပိတ်လိုက်ရန်သင့်တော်သည့်အခါန် သုံးသပ်
ပွဲရှုခိုင်နှင့် ပွဲရှုခိုင်နှင့်
ပွဲရှုခိုင်နှင့်

■ 중부 대기중인 모돈에게 수퇘지를 접촉시켜 발정률을 촉진

သားတင်ရန်စောင့်ဆိုင်းနေသည့်ဝက်မအား ဝက်သိုးနှင့်တွေ့ချေပြီး လိပ်စိတ်လုံးထော်ခြင်း

따띤양사욱싸인네이핏왓마아 왓또닛핏세이뻬 랜섹록써친

■ 발정파악을 위해 이유 후 3일째부터(일요일)는 하루에 두 차례

(오전 6~7시, 오후 5~6시) 이상 주의 깊게 관찰하여 발정개시 시점을 찾음

သုတေသနပြည်တွင် အမြန်ဆုံး အကျဉ်းချုပ်မှုပါမ်းများ ဖြစ်ပေါ်လိုက်ပါသည်။

뜻못 칭고 사웃찌 얀 녹삐나 웃 뚝 았 마사 웃(뜨닝꼬로) 뛰 뜨 았 린느 째인(므낙 차욱~쿠
느 나이) 냐네이 응아~차욱나이) 쪘 둔 페이 차찌 쿠

★ 발정 관찰을 1일 1회 관찰시 75%, 1일 2회 관찰시 85%, 일 3회 이상 관찰시 95% 이상 발정 발견 가능

သုတေသနပညာမှုပညာကြည့်ရန် 1ရက် 1ကြိမ် 75%, 1ရက် 2ကြိမ် ကြည့်ရမ်း 85%, ထစ်ရက် 3ကြိမ်အထက် ကြည့်ရမ်း 95%

뜻듯청시드시찌안 뜨얏 뜨잰 쿠느愫옹아야카이농, 뜨얏 느찌인찌슈친 싯쎄이옹아야
카이농, 뜨얏 똥째인아탁찌수칭 고쎄이옹아야카이농

★ 미경산돈의 발정 관찰시 관리자가 관찰할 경우 50%, 수놈을 접촉시킬 경우

90% 이상 발견 가능

သားမတင်ရသေးသည့်ဝက်၏ သုတေသနတွင် အား တာဝန်စံက ကြည့်ရှုစဉ် 50%, ဝက်သိုးနှင့်တွေ့ဝေး 90% အတောက်တိုးတက်နိုင်

따르면야떠민왓잇 뚝록친아 따운칸가 찌슈신 응아세이야카이농, 왓또닛떴세이뻬 꼬
쎄이야카이농아텟도딱나인

단어모음 စကားလုံးများ စွဲည်ဗုံး
사까롱먀 숙시묵

발정 관찰

baljeong gwanchal
발정관찰
발정관찰은 봄과 여름에 햇볕에
놓아둔 청시모시를 세이친

수퇘지

sutwaeji 왓노

접속
jeobchog

발정 **발정**
baljeong

촉진 태어난다

주의 깊게 **至尊**

juui gipge 그 육사 익빼

■ 발정징후에 관찰을 통한 수정 적기 판단

여기서는 여름철에 발생하는 주요 증상과 그에 따른 적기 및 판단 기준을 살펴보겠습니다.

이유일자 신체증상 녹코핏약	0일차 0~10시 약마ут	1일자 1~10시 뜨약마ут	2일자 2~10시 느약마ут	3일자 3~10시 뜻약마ут	4일자 4~10시 레이약마ут	5일자 5~10시 웅이약마ут	6일자 6~10시 차육약마ут	7일자 7~10시 쿠느약마ут						
요일 0~4일 네잇약	목요일 07:00~10:00 짜파뽀떼이	금요일 08:00~10:00 파우짜	토요일 09:00~10:00 스네이	일요일 10:00~10:00 파닝그뇌	월요일 11:00~10:00 파닝라	화요일 12:00~10:00 잉가	수요일 13:00~10:00 복드후	목요일 14:00~10:00 짜파뽀떼이						
오전오후 09:00~10:00 므냑 냐네이	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM

음부발적

아침에도 저녁에도
잉가갓따라치



타모돈 승가

아침에도 저녁에도
아차왓마멧락



사료섭취량

09:00~10:00
왓사사릿쁘마나



웅돈 허용

09:00~10:00
왓포쿤뿌친



사람 허용

09:00~10:00
루아퀸뿌친



1차

00:00~10:00
브트마아제인



2차

01:00~10:00
두뜨야아제인



3차

02:00~10:00
파피야아제인



교배

03:00~10:00
메이라잇칭

단어모음 00:00~10:00
사까롱먀 숙사목

수정 sujeong
적기 jeoggi
판단 pandan

음부발적 eumbubaljeog
타모돈 tamodon
승가 seung-ga
섭취량 seobchwilyang
웅돈 ungdon
허용 heoyong
사람 salam

와丰硕타령
밋띠밋아챈

와진팅팅타령
밋띠밋아챈

와진팅팅
똥팟친

이

잉가갓따라치

아차왓마

메이랏

사통밋쁘마나

왓또

핀뿌칭

루

단어모음 စောင်းများ ထုတ်ပွဲ
사카롱မာ စုစုပါ

이유일자 နို့ချေသွေရှိ 녹괴밋잇	1~2일후 missing 뜨~느갯나out	3일후 missing 똥갯나out	4일후 missing 레이잇나out	5일후 missing 응아잇나out	6일후 missing 차옥잇나out
연한상태 နှုန်းလျှပ်စီအကြောင်း 누낫밋아체이아 네이	경화 ဘုရား 마친	후반에 연화 အနောက်ပိုး ဘွင်္ဂျာမြို့ 아나옥빠인듯瀍 칭	유방이 굳기 시작 ရှင်သားဘဝတောင်လာ 잉따마띠운라	완전히 마름 လုပ်စိန္တာမြုံး 롱와빠인되친	마른유방 ဂိုင်သွေ့င်သား ပေါင်းပေါင်း



	발적 နို့ခြုံး 니애친	종창 ရောင်းလွှုံး 아우라친	발적 နို့ခြုံး 니애친	종창 퇴화 ရောင်းပေါ်လွှုံး 아옹뻬엿리친
작은 돼지의 음부 ဝောဒော် ကိုယ်အပိုင် 떼떼왓잇이가삿	연화 ဟျော်း 벳친	점액누출 အရည်တွက်မြို့ 아예툇친	점액농후 적기 전반 သင့်တော်သည့်အံ့ နဲအပိုင်းတွင်ပျော်ခြော့ သာအရည်တိုက်မြို့ 벳්‌မီတော်အရာ ပေါင်းပေါင်းတို့ 예툇친	적기후반 적기 완료 နောက်စိန္တာရှင်တွင် ပြုဆုံး 나وك빠인아체이 ပေါင်းပေါင်း ပေါင်းပေါင်း



	발적 နို့ခြုံး 니애친	종창 ရောင်းလွှုံး 아우라친	발적 နို့ခြုံး 니애친	종창 퇴화 ရောင်းပေါ်လွှုံး 아옹뻬엿리친	
큰 돼지의 음부 ဝောဒော်အပိုင် 왓찌잇잉가삿	연화 ဟျော်း 벳친	점액누출 အရည်တွက်မြို့ 아예툇친	점액누출 ပုစ်ချေသွေ့အ ရည်တွက်မြို့ 벳්‌မီတော်အား ခြော့ထိုး	적기완료 သာနွောက်လွှုံးမြို့ 뜨때때빠친	적기완료 သာနွောက်လွှုံးမြို့ 뜨때때빠친


이유후 발정과정의 일반적 순서

နိုဒ္ဓပြီးနောက် လိပ်စိတ်ဖြစ်ပေါ်သည့် ပုံမှန်အဆင့်
녹ကျပ်နာ့ချေ ရန်ဆိပ်ဖို့ပဲပဲလိမ့်မှု

1 외음부가 붓고 충혈되기(음부발적) 시작 : 수퇘지 승가허용 24시간 전

2 외음부로부터 점액이 누출

အပြင်အဂိုလတ်မှ ပျစ်ခဲ့ခဲ့အရည်ထွက်လာခြင်း
အပေါ်အဆုံးအမြတ်မြတ် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း



〈외음부 발적 및 점액누출〉

အပြင်အကိုဇ် ဖောင်းလာခြင်းနှင့် အရည်တွက်လာခြင်း
 အပေါ်
 အပေါ်
 အပေါ်

③ 평상시와 다른 울음소리를 내고 공격적인 행동

**ပုံမှန်အခိုင်နှင့်မတူသည့် အသံထွက်ပြီး တိုက်ခိုက်ခြင်း
ဤမှတ်မှတ်မှုများမှ အမြတ်မြတ်ဆုံး အမြတ်မြတ်ဆုံး ဖြစ်ပါသည်**

4 발정기가 되면 사료의 섭취량이 줄어들고 불안, 체온상승

5 군사시 타모돈 승가 시작 : 수퇘지 승가허용 12시간 전

အခြား ၁၀၁။ မိတ်ဆက်လိုက်ခြင်း၊ ၁၂ နာရီမှတိုင်ခင်က မိတ်လိုက်ခွင့်ရသော ၁၀၁။

단어모음	
발정	발정발정발정
balejeong	밸제ঞ্জেঞ্জেঞ্জেঞ্জ
순서	순서순서
sunseo	순서
외음부	외음부외음부
oeumbu	외음부
충혈	충혈충혈
chunghyeol	충혈
점액	점액점액
jeom-aeg	점액
누출	누출누출
nuchul	누출
다른	다른다른
daleun	다른
울음소리	울음소리울음소리
ul-eumsoli	울음소리
섭취양이 줄어들고	섭취양이 줄어들고
seobchhwilyang-i ju-l codeulgo	세브체화링이 줄어들고
간접화법으로 대화하는 것	간접화법으로 대화하는 것
사幡브마나였자	사幡브마나였자
불안	불안불안
bul-an	불안
체온	체온체온
che-on	체온
타모든 승가	타모든 승가
tamodon seung-ga	타모든 승가
전통적인 문화를 전하고자 하는	전통적인 문화를 전하고자 하는
인간문화재	인간문화재



〈군사시 타모돈에게 승가〉

군사시 타모돈에게 승가
아차왓마메이사라잇친

단어모음 စကားများ အပေါ်
사까롱먀 숙시목

수퇘지 승가

sutwaeji seung-ga

օက်ထီး ဂိုလ်လိုက်ခြင်း

왓티메이라잇친

사람승가 허용

salamseung-ga heoyong

ဂိုလ်လိုက်ခြင်း

메이라잇얀퀸뿌친

6 수퇘지 승가허용 시작 : 28시간 후 종부적기(경산돈)

ဝက်ထီး ဂိုလ်လိုက်ခွင့်ပြု ॥ 28 နာရီနောက်ဂိုင်း သားတင်ရန်သင့်တော် (တစ်သားမွှေးပြီးဝက်)
왓티메이사라잇퀸뿌, 느쎄이싯나이나욱빠인 따띤얀띤떠(뜨따뫼뺀윗)



〈수퇘지 승가 허용〉

ဝက်ထီး ဂိုလ်လိုက်ရန်ခွင့်ပြု
왓티메이라잇얀퀸뿌

7 사람승가 허용 시작 : 수퇘지 승가허용 후 12시간 후

ဂိုလ်လိုက်ရန်ခွင့်ပြု ॥ ဝက်ထီး ဂိုလ်လိုက်ရန်ခွင့်ပြုပြီး 12 နာရီ
메이라잇얀퀸뿌 왓티메이라잇얀퀸뿌께 세이넉나이

☞ 사람이 승가해도 부동자세를 취하고 귀를 쫑긋이 세움

ဂိုလ်လိုက်ရန်လုပ်ပေးသော်လည်း မလျှပ်ရှားဘဲ နားစွဲ့နေခြင်း
메이라잇얀록ழော်ပေါ်ရော် မြှုပ်နည်းပေးသော မြတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း



〈사람승가 허용〉
길터리터리 푸드 퍼포먼스:
메이라잇안퀸뿌친

8 사람이 등, 허리부분을 눌러줄 때 피하지 않음

코구라, 허리에 터치되는 부위를 피하는
竦, 카아빠잉꼬 피퍼레이드샤우친



〈허리 누름〉
길터리터리 퍼포먼스:
카고피친

9 위를 근거로 수퇘지 허용 시작 시점을 유추해 종부적기 판단

제100회 제작된 아동 100명의 허리 및 등에 푸드 퍼포먼스:
아탁빠아쳇아야 왓티메이라잇챈간만빼따띤밋아챈칸만

10 발정돈은 락카 등을 이용하여 등에 표시

제100회 제작된 아동 100명의 허리 및 등에 푸드 퍼포먼스:
랜새잇뻬띤왓아라운앤테이뜻테이뻬아맛아파뿌록

11 다음날 필요한 정액량을 파악하여 주문

제100회 제작된 아동 100명의 허리 및 등에 푸드 퍼포먼스:
나웃네이로앗떼뜻애쁘마나찌빼쏭팟

단어모음 000:000:000:000:
사까롱먀 숙사목

등	deung	체
허리	heoli	骭
종부 적기 판단	jongbu jeoggi pandan	종부 적기 판단
파면펫아체인종판	파면펫아체인종판	파면펫아체인종판
락카	lagka	락카
표시	pyosi	표시
정액량	jeong-aeglyang	정액량
파악	paag	파악
주문	jumun	주문

■ 3차 종부 : 2차 종부 후에 계속 발정증세 보이면서 수퇘지 승가를 허용 6~12시간 후에 다시 한번 더 수컷

တတိယအကြမ်သာတစ်ခြေး။ ထတိယအကြမ်သာတစ်ပြီးနောက် လိုင်စိတ်ပေါ်လှပ် ပိတ်လိုက်ခြင်းခွင့်ပြီး 6~12 နာရီအတွက်ပိုင်ပိုင်ဆင်

따띠야아째인따띤친 뚜띠야아째인따띤빠나웃 랜새잇빠린 메잇락친퀸뿌삐 차옥~쎄
이닉나이나우빠빠신

단어모음 တော်များ စုတင်မှု
사끼롱마 숙시묵

이유모돈(종부대기돈) 종부관리

종부방법

သားတင်သည့်နည်းလမ်း 따ດပါန်

■ 인공수정

သန္တတိရင်း

따때띤친

정책의 요건

သုတေသနလိုအပ်ချက် 뜻얘로앗찬

- ▶ 정액은 반드시 17~18℃를 유지하는 전용보관고(온장고)에 보관 및 수송
자연온도 17~18 ℃에서 보관하는 경우는 2~3일입니다. (아무래도) 보관온도는 4~5°C로 추정됩니다. 풋애피 씨이쿤~씨이식 디그리신디그램타빠애캐이뜨파(아뿌께) 뛴데잇삐뿔사운
 - ▶ **돼지정액은 보관온도에 따라 보존시간과 번식성적에 크게 영향 미침**
(희석한 액상정액의 보존기간은 3~5일 이내)
0도에서 자연온도 17~18 ℃에서 보관하는 경우는 2~3일입니다. (아무래도) 보관온도는 4~5°C로 추정됩니다. 풋애피 씨이쿤~씨이식 디그리신디그램타빠애캐이뜨파(아뿌께) 뛴데잇삐뿔사운
 - ▶ **정액이 저온충격을 받거나 직사광선에 노출되지 않도록 주의**
자연온도 17~18 ℃에서 보관하는 경우는 2~3일입니다. (아무래도) 보관온도는 4~5°C로 추정됩니다. 풋애피 씨이쿤~씨이식 디그리신디그램타빠애캐이뜨파(아뿌께) 뛴데잇삐뿔사운
 - ▶ **정액보관고에 보관할 경우에도 정전이나 고장에 대비하여 온장고 내부에 최저 최고 온도계를 넣어두고 수시로 온도를 점검**
자연온도 17~18 ℃에서 보관하는 경우는 2~3일입니다. (아무래도) 보관온도는 4~5°C로 추정됩니다. 풋애피 씨이쿤~씨이식 디그리신디그램타빠애캐이뜨파(아뿌께) 뛴데잇삐뿔사운
 - ▶ **보관고에서 꺼내어 돈사로 이동할 때에도 급격한 온도변화를 막기 위한 스티로폼 박스등의 보온조치가 필요**
저장온도: 자연온도 17~18 ℃에서 보관하는 경우는 2~3일입니다. (아무래도) 보관온도는 4~5°C로 추정됩니다. 풋애피 씨이쿤~씨이식 디그리신디그램타빠애캐이뜨파(아뿌께) 뛴데잇삐뿔사운

1 종부적기의 모돈을 부드럽게 다루어 안정시킴

သားတင်ခိုန်တွင် ဝက်မအား ဖြေးဖြေး ကိုင်ပြီး ငြမ်အောင်လုပ်ခြင်း

따띤첸뛰왓마아 폐페까이삐 낸아옹록친

2 외음부를 물기 있는 깨끗한 종이 수건으로 닦아줌

အပြင်အရိုက်တွင် ရှိသောအရည်အား သန့်ရှင်းသော စက္း။ ပဝါဖြင့်သုတေသနများ

아쁜인가갓뛴 싯떠아얘아 땃싣떠 쎹꾸 뽀와핀뚱빼이친

③ 정액 주입기 주위에 희석액이나 액체 유통제를 적당히 바릅니다.

(일회용 주입기를 쓸 때는 젤리가 필요 없음)

뜻에 뛴 신비이 박원진 뛴 쳐씨 랜 빼친(뜨카 똥 뛴 떻끼리야 꼬 똥린 째씨므로 앗)

4 외손의 엄지와 인지로 외음부를 열고 오른손으로 주입기를 삽입

(주입기의 끝이) 요도입구로 들어가지 않도록 주의)

ဘယ်သာက်လက်၏လက်မနှင့်လက်ညွှန်ပြုခြင် အပြင်အခါးရတ်ကိုဟူပြီး ညာဘယ်လက်ဖြစ် သွင်းသည့်ကိုရိုယာဖြင့် ထပ်မံပါ၍(သွင်းသည့်ကိုရိုယာ၏အခံ့အသားသီးလမ်းကြေားမှာဝေထိ မဝင်စေရန် ရက္ခိုက်)

배뱃락잇락마낫락뇨핏 아뻔인가삿꼬하삐 나박라핏 뛴떳끼리야핀햇안(뛴떳끼리야잇
아송아 시란짜옹아와뜻므원세이양 그유사악)

5 오른손으로 주입기를 잡고 15도 각도 위쪽으로 향하게 하여 15cm정도까지

삽입한 후 주입기를 수평으로 하여 자궁경 입구인 25cm 정도까지 서서히

넣으면서 저항감이 느껴질 때까지 삽입

(외음부로부터 20~25cm 지점에 자궁경부가 있으나 돼지가 클수록 깊음)


ညာဘက်လက်ဖြင့် သွင်းသည့်ကိရိယာကို ထိန်းပြီး 15 ဒီဂရီခန့်၊ အပေါ်သို့ ဦးတည်ပြီး 15 စင်တိမီတာ

သွေးဖြူနှင့်အတူ သွေးသည့်ကိရိယာအား ရောဂါဌနာပြင်အလိုက် သားအီမံခေါင်းပေါက်အတော် 25 င်တိမိတာထာတဲ့ ဖြောကြခြင်း ထည့်ဖြူး ဝက်မ ဆန့်ကျင်သည့်အတဲ့ ထည့်သွေး(အပြင်အငါးလတ်၏ 20~25 င်တိမိတာထာတဲ့ သားအီမံခေါင်းပါးသော်လည်း ဝင်္ဂားကြိုင်ပါးနှင့်မြင်း)

랴박락핏띈떳끼리야고 텅빼 쎄이옹아디리그칸 아뻬돛우띠빼 쎄이옹아신디미다아티
띈뻬나웃 뛴떳끼리야아 애맛나뻔아라잇 따애까웅빠웃아와잇 느쎄잇옹아 씬디미다아
티 폐폐친 테이뻬 왓마 삿찐띠아티햇ଓ(아뻗잉ガ삿잇 느쎄이~느쎄이옹아 신디미다
뒤 뜬애이가옹시떠레이 왓찌립뻔나나잇침)



〈4번 설명 그림〉



〈5번 설명 그림〉

단어모음	侧重 모음
정액	_argv_에
jeong-aeg	돛애
방법	_fn邦_fn법
bangbeob	니란
안정시킴	_fn정_fn시_fn킴
anjeongsikim	년댓세이
수건으로	_fn건_로
sugeon-eulo	변와핀
닦아줌	_argv_여_ :
dakk-ajum	돛베이
희석액	_fn희_fn석_fn액
huiseog-aeg	띤나애
윤활제	_fn활_fn제
yunhwalje	치시
비름	_argv_린_fn름
baleum	돛레인천
엄지	_fn지_ :
eomji	렉마
인지	_fn지_ :
inji	락뇨
주입기	_fn입_fn기_fn야
ju-ibgi	刎苾끼리야
삽입	_fn삽_fn입
sab-ib	刎친
15도	15_fn도_ :
sib-odo	세옹이디그리
각도	_fn각_fn도
gagdo	다웃
위쪽	_fn위_fn쪽
wijjog	아빠째잉
수평	_fn수_fn평
surveong	애만나페

10 정액주입 중 역류가 심하면 주입을 잠시 멈추고 주입기를 전후 좌우로 부드럽게 움직인 후 주입

သတ်ရည်စွာနေစဉ် ပြန်တက်လာလျှင် သွေးသည့်ကိရိယာအား ခဏတာ ရုံးမြို့ ဘယ်ညာသို့ ဖြောမြို့လိုပြီး သွင်းနှင့်

뜻얘뛴네이신 뺨딱라린 뛴떳끼리야야 크나따얏뻐 배냐풋 폐페 록뻐 뛴얀

11 정액주입을 끝낸 후에 주입병이 비워졌을 때는 자궁경관에 공기가 들어가지 않도록 주입기에 약간의 정액을 남겨 둠

(공기가 들어가면 생식기 밖으로 정액을 밀어내어 정액의 역류가 많아짐)

သုတေသနပည့်စီးနေဂာက် သွေးသည့်ပုလင် လွှတ်နေဂျင် သားအိမ်ပေါင်းတွင် လေမဝ သွေးသည့်ကိရိယာတွင် သုတေသနပည့်အနည်းငယ်ချက်(လေဝင်လျင် မျိုးဘားအားအပြင်သို့၊ ဘဏ္ဍာဂိုဏ်အားကုန်းကုပ်ပြီး ဘဏ္ဍာဂိုဏ်ပို့ကုန်းကုပ်)၏

뜻얘뛴삐나욱 뛴밋쁘린 룬네이룬 뜨애인가웅띈 레이므원아옹 뛴띤끼리야띈 뜻얘애네
임애차(레이이워리 묘빠잉가아뻬또 뜻얘아 뜰퉁뻬 뜻얘빠툐나이)

12 주입기에 약간의 정액이 있을 때 주입병을 제거하고

သွင်းသည့်ကိရိယာတွင် သုတေရသိ အနော်းငယ်ရှိလျင် သွင်းသည့်ပူလင်းအားဖယ်ရားပြီး

뛸떻끼리야뛰뚱애아네잉애시린 뛰떻쁘린아페샤뻬

13 주입기 끝 구멍을 손가락으로 막고 30~60초 동안 모든의 등을 눌러 줌

သွင်းသည့်ကိရိယာထိပ်အဝအား လက်ဖြင့်ထိပ်ပြီး 30~60 စက်နံအတွင်း ဝက်မ၏ ကျေအား ဖိပေးရန် ပိုမိုကြည့်ခဲ့ပါ။

14 등을 계속 눌러 주면서 주입기를 시계방향으로 서서히 돌려 뺏

ကျောအေးဆင်တိကိုဖော်ရင် သွင်းသည့်ကိစ္စယာအေး နာရီပါဂါတ်လီးတည်ချက်အထိုင် ဖြောဖြော လှမြှုပြုထုတ်ရန်

쩌야 싸악파익피빼이인 뛰뛴끼리야아 나이락딴웅띠찬아따잉 폐페 랫뻬톡얀

15 인공수정 전후에 암컷을 얌전히 다룸

သန္တတောင်ပြီးနောက် ဝက်မအား ညွင်သာစွာကိုင်တွယ်ရန်

뜨떼띠삐나웃 왓마아 낭따솨까이뙤얀

16 수정일, 시간, 품종(정액명) 등을 기록하고 다음 주입시간 기록

သန္တေသနပည့်သည့်နေ့၊ အဖိုနှင့် အပျို့အတာ၊ (သတ်ရည်အမည်) အစိုးလာည့်အား မှတ်ထားပြီးနောက် ခွင့်သည့်အဖို့၏ ပုဂ္ဂတ်ပေါင်းတင်ရန်

뜨때때띤네잇, 아챈, 아묘아사(뜻얘아얘)아사신띠아 맛타뼈나웃 띤떴아챈 맛딴띤얀

17 일회용 주입기는 재사용하지 않도록 함

တစ်ခါသုံး သွင်းသည့်ကိရိယာအား ပြန်မသုံးရန်

뜨카똥띈띤끼리야아 뺨므똥얀

단어모음	ଓକ୍ତାଲୁଙ୍ଗୁ: ଦୁଇଲୁଙ୍ଗୁ
사끼통마	ସକ୍ରିତମା
주입	ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣପ୍ରିଣ୍ଟିଂ:
ju-ib	ଫିଚିନ୍
제거	ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣପ୍ରିଣ୍ଟିଂ:
jegeo	ଫେଚିନ୍
시계방향으로 돌리다	
sigyebanghyang	ସୁଲୋଡ଼ିଲୋଡ଼ିଲା
ଶବ୍ଦିକାରୀରେଖାତାତ୍ତ୍ଵବ୍ୟାକରଣାଲ୍ୟ	
나이락딴우며켓ାବାଇଲ୍ପି	
빼다	ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣପ୍ରିଣ୍ଟିଂ
ppaeda	ଫେଚିନ୍
주입시간	ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣପ୍ରିଣ୍ଟିଂ
ju-ibsgan	ଫୁର୍ମାଚେନ୍
기록	ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣପ୍ରିଣ୍ଟିଂ
gilog	ଫୁର୍ମାଚେନ୍

기타 관리사항

အခြား ထိန်းသိမ်းရန်လိုအပ်သည့်အချက်များ
아차 텡땡안로악딱아착마

1. 주사시 유의사항

ဆေးထိုးလျှင် သတိပြုရန် အချက်
싸이토휴린 따끔뿜얀 아착

2. 미안마어 단위 표기법

အင်္ဂလိပ် ယူနစ် သက်တဲ့
잉그릭 유닉 띤까따

근육주사

ကြံက်သားဆေးထိုးမြင်း
ဈဗ္ဗာပါယီတွင်

■ 근육주사는 귀 바로 아래와 귀 뒷부분 및 어깨 앞쪽의 목 부분에 주사

ကြက်သားသေးသည် နားအဖောက်ပိုင်း၏အောက်နှင့် နားနောက်ပိုင်းနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်

찢따쎄이띠 나아나웃빠옹잇아웃닛 나나웃빠잉닛 브콩아샛빠옹래뺀아빠인뛰토얀

■ 허벅다리와 엉덩이 또는 허리 부위에는 주사는 비권장

(출혈 또는 멍 자국으로 상품가치가 떨어짐)

ပေါင်နှင့်တပ်းမားအလိုင်းသို့၊ ဆေးမထိုးရန်(သွေးထွက်ခြင်း သို့မဟုတ် အညီအစံမြစ်သေသဖို့
ပစ္စည်းတန်ဖိုးလျော့ကျုံ)

빠우닛띠빠, 카아빠인뜻 쐐이므로양(뙤ѿ룬친또므혹 아뇨아메핏세뜨핏뺏시딴포엿짜)

■ 적절한 크기의 주사바늘을 사용

သင့်တော်သော အရှယ် ဆေးထိုးအပ်သုံး

떳떳아외쎄이토앗꼰

사육단계 ဧ:သည်အဆင့် 뫼띠아씻	크기(게이지) အျမှတ်အေး (gauge) 아와아사	길이(인치) အရှည် (inch) 아섀
젖먹이돼지 နိုးဘိုးပေါက် 녹속띠짜육	18 또는 20 18 ဒို့မှုစိ 20 새식 또므혹 느새	5/8 또는 1/2 5/8 ဒို့မှုစိ 1/2 싯빠인웅아빠인 또므혹 낮빠인뜨빠인
젖뗀돼지 နိုးခြေသည့်ဘားပေါက် 녹코띠짜육	16 또는 18 16 ဒို့မှုစိ 18 셋차육또므혹셋식	3/4 또는 5/8 3/4 ဒို့မှုစိ 5/8 레이빠인뚱빠인 또므혹 싯빠인웅아빠인
비육돈 အသာဓဝိဝက် 아파또왓	16	1
번식돈 ဧံဗ္ဗာဝိဝက် 묘빠왓	14, 15 또는 16 14, 15 ဒို့မှုစိ 16 셋레이, 셋웅아 뜶므혹 셋차육	1 또는 1.5 1 ဒို့မှုစိ 1.5 뜻 또므혹 뜶따ဝါမာ

단어모음 စကားလုံးများ စုစည်းမှု 사까롱먀 숙시묵

근육	କ୍ରେନ୍-ୟୁଗ	କ୍ରେନ୍-ୟୁଗ
귀	gwi	କ୍ରେନ୍-ୱା
아래	alae	କ୍ରେନ୍-ଅଉ
뒷부분	dwisibubun	କ୍ରେନ୍-ଅନ୍ତର୍ଗତିର୍ଦ୍ଦିଃ
어깨 앞쪽	eokkae apjog	କ୍ରେନ୍-ଆନ୍ତର୍ଗତିର୍ଦ୍ଦିଃ
적절한	jeogjeolhan	କ୍ରେନ୍-ଅନ୍ତର୍ଗତିର୍ଦ୍ଦିଃ
주사 바늘	jusa baneul	କ୍ରେନ୍-ଅନ୍ତର୍ଗତିର୍ଦ୍ଦିଃ

피하주사

အရည်ပြားအောက်ဆေးထိုးခြင်း
아예빠아웃씨이토친

■ 깨끗하고 건조한 곳에서 주사

သန်ရင်းပြီးကြောက်သွေ့သောနေရာတွင်ထိုးရန်
ပတ်ပေါ်ခဲ့ဖြစ်ပါသည်။

■ 자돈의 경우 피부가 충분히 늘어지는 옆구리 부위에 주사

ဝက်သားပေါက်ဖြစ်လျှင် အရေပြားဆွဲလို့ ရမည့် ခါးဘေးအပိုင်းတွင်ထိုးခြင်း

왓따빠웃핏린아얘빠쇠롯야밋카배이아빤뛴토친

■ 근육에 주입되지 않도록 적절한 크기의 주사바늘과 각도가 요구됨

■ 육성돈 이상의 큰 돼지는 적절한 크기의 주사바늘을 사용

단어모음 ဧကားလုံများ စုည်းမှု 사까롯မာ 숲시물

အရေဖျားအောက်

piha 아애빠아웃

옆구리 부위 ၁၁၃

yeopguli buwi 배이난요아빠인

적절한 **သင့်တော်ဘာ**

jeogjeolhan 떤펴펴

주사바늘
iusebapeul

Jusabancar 11

사육단계 畜齋等級 뫼띠아셋	크기(게이지) ้า구르드아타: (gauge) 아와아사	길이(인치) அஷ்டி (inch) 아새
젖뗀돼지 չ.ჰி.வ.ந்.ா.ங் 녹귀땃윗	16 또는 18 16 வி.ஷ.ா.த் 18 셋차육또므후 셋식	1/2 느빠인프빠인
비육돈 ஆ.கா.க.பி.க்.ங் 아파또왓	16 셋차육	3/4 레이빠인뚱빠인
번식돈 வி.ஷ.ா.ங் 묘빠왓	14 또는 16 14 வி.ஷ.ா.த் 16 셋레이 또므후 셋차육	1 뜻

■ 약품병의 주입구를 비강내 깊숙이 삽입하고 돼지의 머리부분을 위로 향하게 한 후 약품을 주입

ເຂົາບຸລັດໆໃໝ່ ຂອງດີວ່າມີພະຍົດໆແວ່ລະກົດໆເວັບໄຊໆ ພົມມືສູງໃຫຍ່ ດັກກົງມືສູງໃຫຍ່ ດັກກົງມືສູງໃຫຍ່

쎄이밸린잇 뛴떳아뱅아 나카옹아뛴挺好 낙상좌뛴뻬 왓잇 가옹아빠잉아 아헷挺好 우띠세뻬
쎄테잇안

동물용의약품의 보관 및 사용

တိရှိနှင့်သုံးဆေးပစ္စည်းထိန်းသီမ်းခြင်းနှင့် အသုံးပြခြင်း
뜨렛산동세ုံစံပိုင်ခိုင်နှင့်

■ 백신 및 호르몬제는 냉장고내에서 2~8°C 이내로 보관

ကာကွယ်ဆေးနှင့် ပောမှန်ဆေးသည့် ရေခဲသွေ့တွင် 2~8 မီလီဂရိစိတ်အတွင်းထိန်းသိမ်းရှုံး
ကာကွယ်ဆေးနှင့် ပောမှန်ဆေးသည့် ရေခဲသွေ့တွင် 2~8 မီလီဂရိစိတ်အတွင်းထိန်းသိမ်းရှုံး
ကာကွယ်ဆေးနှင့် ပောမှန်ဆေးသည့် ရေခဲသွေ့တွင် 2~8 မီလီဂရိစိတ်အတွင်းထိန်းသိမ်းရှုံး
ကာကွယ်ဆေးနှင့် ပောမှန်ဆေးသည့် ရေခဲသွေ့တွင် 2~8 မီလီဂရိစိတ်အတွင်းထိန်းသိမ်းရှုံး

■ 스티로폼 박스 상단을 제거하고 냉장고에 보관

ဧງ့ဘူးသေတ္တာ အပေါ်ပိုင်းအားဖယ်ရှားပြီး ရေခဲသေတ္တာတွင်သိမ်းဆည်း
ဖော်ပြတ်ပေါ်ပြန်လည်ပေါ်ပြန်ပေးပို့ဆောင်ရွက်ခဲ့သော အမြတ်အမြတ် အမြတ်အမြတ်

■ 냉장고에는 최고·최저 온도계 비치하여 수시로 온도 확인

■ 약품은 직사광선을 피하고 서늘한 보관함에 사용 약제와 미사용 약제 별도
보관

쎄마아 네이야우치딱야잇티돛친마 사옹뻬 에이마떠 때잉세멋 뜻따뛴 아뚱뾰뿌띠쎄
닝 므뚱야떼이띠세이후윗 켜차 때잉쎄이야

■ 보관상태가 불량한 약제나 유효기간이 지난 약제는 주기적으로 폐기

သိမ်းဆည်းသည့်အကြောင်းရှုပါ၏ကောင်းလျှင်၊ သေး၏ သိမ်းဆည်းသည့်အခြားကော်သွားသော ပစ္စည်းများအား အစဉ်မပြတ် စွန့်ပိုက်ပါ၏။

땡쎄떴아체아네이므까웅린 쐐잇때잇쎄떴아챈찌꽈띠 뽀신야아 아신므뽀 쓱뺏친


■ 사용 후 남은 백신 및 호르몬제 돈사내 방지 금지

သုဒ္ဓါနာဂ်ကျိုရှိသော ကာကွယ်ဆေးနှင့် ပေါ်မှန်းဆေးအား ဝက်ခြုံအတွင်းမထားရန်
ဝါယာနှုန်းအတွက် အမြတ်ဆုံး ပေါ်မှန်းဆေးနေရန် အတွက် အမြတ်ဆုံး ပေါ်မှန်းဆေးနေရန်

■ 약품 사용자는 약품의 휴약기간을 확인한 후 사용

ເຄີຍຫຼັງຈາກນີ້ ເພື່ອສະຫຼຸບມີຄວາມສຳເນົາໃຫຍ່ ແລ້ວ ພົມວິໄລ ສະຫຼຸບມີຄວາມສຳເນົາໃຫຍ່

단어모음	ଓଡ଼ିଆରୁ ଦେଖନ୍ତିରୁ ଶାକରୂମା ସ୍ଥିତି
의약품	ସେୟାପ୍ୟୁମ
uiyapgum	ସେଇବ୍ରି
보관	ବୈଷଣିକିରିଣି
bogwan	ପୈଇସେଚି
사용	ଆୟାପ୍ରିଣି
sayong	ଆପ୍ରିବିଲିଂ
냉장고	ଫେରେଲୋଗ୍ଗା
naengjang-go	ୱେକେଟାର୍ଡା
수시로	ଆହନ୍ତିଲିଂଟର୍
susilo	ଆଶିମ୍ବାତ୍
온도 확인	ଆୟିନ୍ଦିରିଣ୍ଟାଇଲିଂଟର୍
ondo hwag-in	ଆପ୍ରିଚିନ୍ସିଏଇଚିନ
직사광선	jiggawwangseon
ଫେରେନ୍ଦିରିଣ୍ଟାଇଲିଂଟର୍	
네이ଆୟକ୍ରାଚିଂ	
피하고	ଫିହାଗ୍
pihago	ଶାଉବୀ
사용	ଆୟାପ୍ରିଣି
sayong	ଆପ୍ରିବିଲିଂ
악제	ସେୟାପ୍ୟୁମ
yagie	ସେଇବ୍ରି
미사용	ଫାର୍ମାସ୍ୟୁରୋ
misayong	ମର୍ଫାଟାଫେଯି
불량	ଫେରେନ୍ଦିରିଣ୍ଟାଇଲା
bullyang	ମର୍କାଉଫ୍ରେ
주기적	ଆହନ୍ତିଲିଂଟର୍
jugjeog	ଆଶିମ୍ବାତ୍
폐기	ଫିର୍ମାନ୍
pyegi	ଶୁଣ୍ଟେ
돈시내	ଦିନିକାପ୍ରାଇନ୍
donsanae	ଅତଚାଇଫିନ୍
방치 금지	ମାତ୍ରାକ୍ଷର୍ଣ୍ଣ
bangchi geumji	ମର୍ଟାନ୍
휴약기간	ସେୟାପ୍ୟୁମାଲ୍ଟାର୍କିପ୍
hyuyaggigan	ସେଇନାମ୍ରାକ୍ଷର୍ଣ୍ଣ
확인	ଠିକ୍କାଇଲିଂଟର୍
hwag-in	ଶିକ୍ଷିଚିନ



〈약품 및 백신 저장〉
เภสัชกรรมที่ดี คือการดูแลและรักษาสุขภาพ:
บริการที่ดี ใจดี ใส่ใจ ให้คำแนะนำอย่างดี

MEMO

2. 일자 || 흑.백 닉네이트

1일	1 뾰	뜨약
2일	2 뾰	느약
3일	3 뾰	뚱약
4일	4 뾰	레이약
5일	5 뾰	응아약
6일	6 뾰	차웃약
7일	7 뾰	쿠느약
8일	8 뾰	싯약
9일	9 뾰	꼬약
10일	10 뾰	새약

3. 횟수 ၄။ အကြမ်းရေ ရေါ်အား

1회	1 ၊	뜨째인
2회	2 ၊	느째인
3회	3 ၊	뚱째인
4회	4 ၊	레이째인
5회	5 ၊	응아째인
6회	6 ၊	차웃째인
7회	7 ၊	쿠느째인
8회	8 ၊	식째인
9회	9 ၊	꼬째인
10회	10 ၊	새째인

4. 개수 ၅။ အရေအတွက် ဗျာအယား

1개	1 ၊	뜨ку
2개	2 ၊	느ку
3개	3 ၊	뚱ку
4개	4 ၊	레이ку
5개	5 ၊	응아ку
6개	6 ၊	차욱ку
7개	7 ၊	쿠닉ку
8개	8 ၊	식ку
9개	9 ၊	꼬ку
10개	10 ၊	새ку

5. 단위 ၆။ ယူနစ် ဗျာ ယုနာ

부피	အဆုံးအတား	အေား
ml	မီလီလီတာ	မီလီလီ
l	လီတာ	လီ
길이	အရှည်	အရှည်
cm	စတုဝသတာ	စတုဝသ
m	မီတာ	မီ
m ²	စတုရန်းမီတာ	စတုရန်း
무게	အလေးရန်	အလေး
g	ဂရမ်	ဂရမ်
kg	ကိုပ္ပါဒ်	ကိုပ္ပါဒ်
t	တိန်	တိန်

6. 시간 ၇။ အချိန် အချိန်

오전	မနက်ပို့း	မန်ပါး
오후	နေ့လည်ပို့း	နေ့လည်ပါး
시	နာရီ	နာရီ
분	မိန်	မိန်

ex) 오전 7시 30분 ၀၈၂၉။ မနက်ပို့း 7 နာရီ 30 မိန်

7. 요일 ၈။ နေ့ရက် ကျော်

월요일	တနင်္လာ	တိန်လာ
화요일	အောင်	အောင်
수요일	ဇွဲ့ဟော	ဇွဲ့ဟော
목요일	ကြောသပေး	ကြောသပေး
금요일	သောကြာ	သောကြာ
토요일	စင်္ဒာ	စင်္ဒာ
일요일	တန်ငါး	တိန်ငါး

8. 주 ၉။ ဗုတ် ရှိခို

1주(한주)	1 ဗုတ်	뜨ဗု	1주(첫째주)	1 ဗုတ်	뜨ဗု(Pruitt Mai-goo)
2주(두주)	2 ဗုတ်	느ဗု	2주(둘째주)	2 ဗုတ်	느ဗု(두뜨ဗု)
3주(세주)	3 ဗုတ်	뚱ဗု	3주(셋째주)	3 ဗုတ်	뚱ဗု(တဲ့ပူဗု)
4주	4 ဗုတ်	레ဗု	4주	4 ဗုတ်	레ဗု
5주	5 ဗုတ်	응ဗု	5주	5 ဗုတ်	응ဗု
6주	6 ဗုတ်	치ဗု	6주	6 ဗုတ်	치ဗု
7주	7 ဗုတ်	ကျော်	7주	7 ဗုတ်	ကျော်
8주	8 ဗုတ်	ရှိဗု	8주	8 ဗုတ်	ရှိဗု
9주	9 ဗုတ်	꼬ဗု	9주	9 ဗုတ်	꼬ဗု
10주	10 ဗုတ်	새ဗု	10주	10 ဗုတ်	새ဗု

9. 개월 ၁၀။ ကျော်

1개월	1 ဗု	뜨ဗု
2개월	2 ဗု	느ဗု
3개월	3 ဗု	뚱ဗု
4개월	4 ဗု	레ဗု
5개월	5 ဗု	응ဗု
6개월	6 ဗု	치ဗု
7개월	7 ဗု	ကျော်
8개월	8 ဗု	ရှိဗု
9개월	9 ဗု	꼬ဗု
10개월	10 ဗု	새ဗု

부 록

နောက်ဆက်တွဲဖော်ပြချက်
나욱싹틔 페빠착

1. 표준근로계약서

အလုပ်သမားတေသာချုပ်

အရွယ်အစာဆုံး

2. 외국인근로자방역관리지침

နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားကာကွယ်ရေး လမ်းညွှန်ချက်

나이안차따 အရွယ်အစာဆုံး

표준근로계약서(농업·축산업 분야)

အ လုပ် ၃၁ လူပြ (နိုင်လျှော့မြှော်)

170

이에 당사자는 다음과 같이 근로계약을 체결하고 이를 성실히 이행할 것을 약정한다.

사용자 인증번호	업체명 <input type="text"/>	전화번호 <input type="text"/>
	소재지 <input type="text"/>	
	설명 <input type="text"/>	사업자등록번호 (주민등록번호) <small>주민등록번호는 13자리로 표기합니다. (예) 123-4567-890123456789)</small>
근로자	설명 <input type="text"/>	생년월일 <input type="text"/>
	본국 주소 <input type="text"/>	

2. **வாய்மை** வாய்மை என்பது கணக்கில் நிர்ணயித்து வரும் ஒரு அளவாகும்.

- 업종:
 - 사업내용:
 - 주요내용: (제작장소 또는 기관 종류, 해외 활동 등을 구체적으로 기재)

3. **առաջնորդ** — **առաջնորդություն**

- 시 분 - 시 분 - 월 ()시간
4. 근로시간: *60분()월 일 - 월 일) 근로시간: 시 분 - 시 분

*근로기준법 제63조에 따른
농동, 축산, 양잠, 수산 사업의
경우 같은 법에 따른 근로시간,
휴게, 휴일에 관한 규정은 적
용받지 않음.

5. 휴게시간
급증시간 중 신시시간을 포함하여 ()시간 ()분을 휴게시간으로 정합니다.

5. အဆုတ်မှတ်၏ အကျင့်မြှုပ် အသေစာတမ်း မူလဒ် ()မှတ် () မိန္ဒီတွင် ဖော်ပြုခြင်း သတ်မှတ်မည်။

«(აღმართული ინიციატივი) კუთხოვთმებულ
ქადაგში იცის მის აღმართულისა
ჰომილიურ ინიციატივა არა ა ამიტოვ
არა მართვული ინიციატივა.
ამიტოვ ინიციატივა არა არ არის ამას მიზანისა.

11. 이 계약에서 정하지 않은 사항은 「근로기준법」에서 정하는 바에 따른다.

년 월 일
(YY/MM/DD)

Korean (한국어)

외국인 근로자가 지켜야 할 사항

➊ 자국에서 축산물을 휴대하여 반입하지 않는다.



- 쇠고기, 돼지고기, 닭고기
계란, 오리알, 햄, 소시지,
육포, 치즈 등

➋ 농장 근무시 준수사항



- 농장입구에서 차량 및 사람 소독을 철저히 한다.
- 축사 출입전에 반드시 작업복과 장화를 갈아 신고 들어간다.
 - 축사 입구에서 손과 신발을 소독하고, 축사 밖의 장비를 가지고 들어갈 경우 함께 소독한다.



- 
 - 축사에서 나올때 입구에서 손과 신발, 시용 장비를 소독한다.
 - 축시입구 소독조는 2일에 한번씩 갈아준다.
 - 농장 주변을 깨끗이 청소하고 작업복은 2~3일에 한번 이상 세탁하여 활용한다.
 - 시료를 적게 먹거나 평소와 달리 이상한 행동을 할 때에는 신속하게 농장주에게 알린다.
 - 소독약제 사용은 약품의 희석비율 내로 사용도록 한다.

● 일과 후 준수사항



- 다 농장 방문은 금지하고 급한 용무는 가급적 전화를 한다.
 - 가족·친구 등을 만날 때에는 농장 밖에서 만나도록 한다.
 - 외출할 때는 외출전용 의복과 신발을 착용하고 외출한다.
 - 귀가 즉시 손과 신발을 소독하고 깨끗이 목욕한다.

မြန်မာစာ (미얀마어)

နိုင်ငံခြား အလုပ်သမားများ လိုက်နာရမည်။ ဥပဒေများ

- ၁။ မြန်မာနိုင်ငံမှ အသား၊ ငါး၊ သစ်သီးများ မယူလာရ။



- အမဲသား၊ ဝက်သား၊ ကြော်သား၊ ကြော်ဦး၊ ဘဲဦး၊ ဝက်အူရောင်း၊ အသားခြာက်၊ ဒီနှဲ။

- ၂။ ဓမ္မာဗြာရေးခြိတွင် အလုပ်လုပ်သည်။ အခါကို လိုက်နာရမည်။ ဥပဒေများ



- ဓမ္မာဗြာရေးခြိကို ဝင်တွင် ကား၌ ရှိသော ပိုးမွားများနှင့်၊ လူဇီးကိုယ်ခန္ဓာလ်ရှိသော ပိုးမွားများကို ကင်းစင်အောင် လုပ်ပြီးမှ ဝင်လာရမည်။
- ဓမ္မာဗြာရေးခြိထဲ မဝင်ခင် အလုပ်အ ကျို့နှင့်၊ ဘွတ်ဖိနပ် ပြောင်းဝတ်ပြီး ဝင်လာရမည်။

- ဓမ္မာဗြာရေးခြိတွင်း အဝင်တွင် လက်နှင့်၊ ဒီနပ်ကို ပိုးမွားကင်းစင်အောင် လုပ်ပြီး ပစ္စည်း တစ်ခါး၊ ကို ယူပြီး ဝင်ချင်လျှင် ထို ပစ္စည်းများကိုလည်း၊ ပိုးမွားကင်းစင်အောင် လုပ်ရမည်။



- မွေးမြှုပေးခြီးမှ ထွက်လာချိန်တွင် ဝင်ပေါက်မှ
လက်၊ စိန်၊ အသုံးပြုဆဲ စက်ပစ္စည်း
များကို သန့်.ရှင်းအောင် လုပ်ရမည်။
- မွေးမြှုပေးခြီး ဝင်ပေါက်တွင်ရှိသည်。
သန့်.ရှင်းရေးဝန်ထမ်းကို (ဖွှဲ့ဖွှဲ့ပန်စွမ်းများ)
နှစ်ရက်လျှင် တစ်ကြိမ် ပြောင်းပေးရမည်။

- မွေးမြှုပေးခြီး အနီးတစိုင်ကို သန့်.ရှင်းအောင် လုပ်ရမည်။
- အလုပ်အကျိုကို နှစ်ရက် သို့.မဟုတ် သုံးရက်တစ်ကြိမ်လျှော်ပြီး ဝတ်ရမည်။
- တိရိစ္ဆာန်များက အစားအစာများကို ပုံမှန်စားသည်.နှစ်းထက် လျော့လာလျှင်သော်
လည်းကောင်း၊ အမှုအရာ ပြောင်းလဲလာလျှင်သော်လည်း၊ ထိုအချိန်တွင် မွေးမြှုပေး
ခြိုင်ရှင်ကို အမြန်ဆုံး အသိပေးရမည်။
- ပို့မွားကောင်းစင်သော ဆေးများကို အချိုးကျကျ ရောစပ်ပြီး အသုံးပြုရမည်။

● ၃။ အလုပ်ပြီးဆုံးချိန်တွင် လိုက်နာရမည်။ ဥပဒေများ




- အခြား မွေးမြှုပေးခြီးသို့.မသွားရ၊ အရေးကြီး
သည်. ကိုစရိတ်လျှင် ပုန်းဆက်ရမည်။
- ပိုသားစုံ၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်
တွေ့သည်.အခါ မွေးမြှုပေးခြီး
အပြင်တွင် တွေ့ရမည်။

- အပြင်ထွက်သည်.အခါ အလုပ်လုပ်ချိန်တွင် ဝတ်သည်.အဝတ်စားကို မဝတ်ရ။
- အလုပ်ပြီးချိန်တွင် တစ်ကိုယ်ရည် သန့်.ရှင်းမှူး လုပ်ရမည်။

MEMO

MEMO



양돈장관리매뉴얼 미얀어판

인 쇄 2016년 11월
발 행 2016년 11월
발 행 인 김태환
발 행 처 농협중앙회 축산경영부
주 소 04516 서울특별시 중구 새문안로 16
전 화 02-2080-6577 팩 스 02-2080-6560
홈페이지 <http://www.nonghyup.com>
인 쇄 처 농민신문사(☎ 02-3703-6074)

비매품 농협중앙회의 하락없이 인용하거나 전체 및 부분적 무단복제를 금함

